

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: Bromard

Productsoort(en): PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

PT 14 - Rodenticiden

Toelatingsnummer: BE2014-0019

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0008428-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	4
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	4
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	4
4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	5
4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	6
4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	6
4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	7
4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	7
4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	7
4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	8
4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	8
4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	9
4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	9

4.4.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	9
4.4.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	9
4.4.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	9
5. Algemene gebruiksaanwijzing	10
5.1. Gebruiksvoorschrift	10
5.2. Risicobeperkende maatregelen	12
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	12
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	13
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	13
6. Overige informatie	13

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

Bromard
Sakarar B Pasta

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Rentokil Initial Limited
	Adres	Hazel House Millennium Park - Naas Ierland
Toelatingsnummer	BE2014-0019	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0008428-0000	
Toelatingsdatum	03/05/2013	
Vervaldatum	15/03/2023	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Rentokil Initial Supplies
Adres van de fabrikant	Webber Road, Knowsley Industrial Park L33 7SR Liverpool Merseyside Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	Webber Road, Knowsley Industrial Park L33 7SR Liverpool Merseyside Verenigd Koninkrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	12 - Bromadiolon
Naam van de fabrikant	PelGar International Ltd
Adres van de fabrikant	Unit 13, Newman Lane, Alton GU34 2QR Hampshire Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	Prazka 54 28002 Kolin Tsjechische Republiek
Werkzame stof	12 - Bromadiolon
Naam van de fabrikant	Liphatech S.A.S
Adres van de fabrikant	Bonnel BP3 47480 Pont du Casse Frankrijk
Productielocatie	AlzChem Trostberg GmbH, Chemiepark Trostberg, Dr. Albert-Frank-Straße 32 83308 Trostberg Duitsland

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Werkzame stof	28772-56-7	249-205-9	0.005

2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	Kan het ongeboren kind schaden. Veroorzaakt schade aan organen (bloed) bij langdurige of herhaalde blootstelling .
-------------------------	---

Veiligheidsaanbevelingen

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft

NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen.

Achter slot bewaren.

naar

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Huismuizen - gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid - binnen

Productsoort	PT 14 - Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Mus musculus-Huismuis-Adulten en Juvenilen
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	In lokdozen - Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde lokaasstations
Dosering en frequentie van de toepassing	Gebruik maximaal 10 gram per lokaaspunt - / - Gebruik per lokaaspunt tot maximaal 10 g. Plaats lokaasdozen op 10 meter afstand van elkaar. Reduceer tot 5 meter in gebieden met een hoge infestatie.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Pasta verpakt in witte HDPE tubes (cartridges) van 300 of 400g. De verschillende mogelijke verpakkingen: <ul style="list-style-type: none">• voor tubes van 300 g : 10 stuks (3 kg) ; 12 stuks (3.6 kg) ; 15 stuks (4.5 kg) ; 18 stuks (5.4 kg) ; 21 stuks (6.3 kg) ; 24 stuks (7.2 kg) ; 25 stuks (7.5 kg) ; 27 stuks (8.1 kg) ; 30 stuks (9 kg) ; 33 stuks (9.9 kg).• voor tubes van 400 g: 8 stuks (3.2 kg) ; 10 stuks (4 kg) ; 12 stuks (4.8 kg) ; 15 stuks (6 kg) ; 18 stuks (7.2 kg) ; 21 stuks (8.4 kg) ; 24 stuks (9.6 kg) ; 25 stuks (10 kg).

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.

Waar mogelijk, inspecteer de behandelde zone om de 4 weken om te verzekeren dat er geen resistente muizenpopulatie aanwezig is.
Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Informeel indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar]

Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (gaten dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

Om het risico op secundaire vergiftiging te reduceren, zoek gedurende de behandeling regelmatig naar dode dieren en haal ze weg, minstens even vaak als het lokaas wordt gecontroleerd en/of bijgevuld. Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Permanent gebruik als middel voor muizenbestrijding is enkel toegelaten indien er een groot risico is op herinfestatie en andere controle methoden onvoldoende werkzaamheid bieden.
Permanente plaatsing zal regelmatig geëvalueerd worden in de context van een geïntegreerd ongediertebestrijdingsprogramma en in functie van het risico op herinfestatie.

Het is niet toegelaten het product te gebruiken in pulserende lokaaspunten.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaasdozen dicht bij (af)wateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt vermeden.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

zie sectie 5.4

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

zie sectie 5.5

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Muizen - gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid - buiten rond gebouwen

Productsoort

PT 14 - Rodenticiden

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	niet relevant voor rodenticiden
	Mus musculus-Huismuis-Adulten en Juvenilen
Toepassingsgebied	Buiten
	Buiten rond gebouwen
Toepassingsmethode(n)	In lokdozen - Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde lokaasstations
Dosering en frequentie van de toepassing	Gebruik per lokaaspunt tot maximaal 10 g - - Gebruik per lokaaspunt tot maximaal 10 g. Plaats lokaasdozen op 10 meter afstand van elkaar. Reduceer tot 5 meter in gebieden met een hoge infestatie.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>Pasta verpakt in witte HDPE tubes (cartridges) van 300 of 400g. De verschillende mogelijke verpakkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voor tubes van 300 g : 10 stuks (3 kg) ; 12 stuks (3.6 kg) ; 15 stuks (4.5 kg) ; 18 stuks (5.4 kg) ; 21 stuks (6.3 kg) ; 24 stuks (7.2 kg) ; 25 stuks (7.5 kg) ; 27 stuks (8.1 kg) ; 30 stuks (9 kg) ; 33 stuks (9.9 kg). • voor tubes van 400 g: 8 stuks (3.2 kg) ; 10 stuks (4 kg) ; 12 stuks (4.8 kg) ; 15 stuks (6 kg) ; 18 stuks (7.2 kg) ; 21 stuks (8.4 kg) ; 24 stuks (9.6 kg) ; 25 stuks (10 kg).

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden. Plaats de lokaaskisten in gebieden waar geen risico is op overstroming. Vervang lokaas in lokaaskisten waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd. Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.

Waar mogelijk, inspecteer de behandelde zone om de 4 weken om te verzekeren dat er geen resistente muizenpopulatie aanwezig is.

Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Informeert indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar]

Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (gaten dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

Om het risico op secundaire vergiftiging te reduceren, zoek gedurende de behandeling regelmatig naar dode dieren en haal ze weg, minstens even vaak als het lokaas wordt gecontroleerd en/of bijgevuld. Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Permanent gebruik als middel voor muizenbestrijding is enkel toegelaten indien er een groot risico is op herinfestatie en andere controle methoden onvoldoende werkzaamheid bieden.

Permanente plaatsing zal regelmatig geëvalueerd worden in de context van een geïntegreerd ongediertebestrijdingsprogramma en in functie van het risico op herinfestatie.

Het is niet toegelaten het product te gebruiken in pulserende lokaaspunten.

Dit product niet direct in de muizengaten aanbrengen.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaasdozen dicht bij open water (rivieren, meren, kanalen,...) worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt vermeden.

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

zie sectie 5.4

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

zie sectie 5.5

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Huismuizen - Professioneel - binnen

Productsoort

PT 14 - Rodenticiden

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

niet relevant voor rodenticiden.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Mus musculus-House mouse-Adulten en Juvenilen

Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	In lokdozen - Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde lokaasstations
Dosering en frequentie van de toepassing	Maximaal 10g per lokaasdoos - / - Gebruik per lokaaspunt tot maximaal 10 g. Plaats lokaasdozen op 10 meter afstand van elkaar. Reduceer tot 5 meter in gebieden met een hoge infestatie.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Pasta verpakt in witte HDPE tubes (cartridges) van 300 of 400g. De verschillende mogelijke verpakkingen: <ul style="list-style-type: none"> • voor tubes van 300 g : 10 stuks (3 kg) ; 12 stuks (3.6 kg) ; 15 stuks (4.5 kg) ; 18 stuks (5.4 kg) ; 21 stuks (6.3 kg) ; 24 stuks (7.2 kg) ; 25 stuks (7.5 kg) ; 27 stuks (8.1 kg) ; 30 stuks (9 kg) ; 33 stuks (9.9 kg). • voor tubes van 400 g: 8 stuks (3.2 kg) ; 10 stuks (4 kg) ; 12 stuks (4.8 kg) ; 15 stuks (6 kg) ; 18 stuks (7.2 kg) ; 21 stuks (8.4 kg) ; 24 stuks (9.6 kg) ; 25 stuks (10 kg).

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Inspecteer regelmatig de lokaasdozen: bij de start van de behandeling om de 2-3 dagen, en daarna elke week, om te verzekeren dat het lokaas geaccepteerd wordt, de lokaasdozen onbeschadigd blijven en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.
Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

zie sectie 5.2

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaasdozen dicht bij (af)wateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt vermeden.

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

zie sectie 5.4

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

zie sectie 5.5

4.4 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 4 - Muizen - Professioneel - buiten rond gebouwen

Productsoort	PT 14 - Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Mus musculus-Huismuis-Adulten en Juvenilen
Toepassingsgebied	Buiten Buiten rond gebouwen
Toepassingsmethode(n)	In lokdozen - Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde lokaasstations
Dosering en frequentie van de toepassing	Gebruik per lokaaspunt tot maximaal 10 g - / - Gebruik per lokaaspunt tot maximaal 10 g. Plaats lokaasdozen op 10 meter afstand van elkaar. Reduceer tot 5 meter in gebieden met een hoge infestatie.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Pasta verpakt in witte HDPE tubes (cartridges) van 300 of 400g. De verschillende mogelijke verpakkingen: <ul style="list-style-type: none">• voor tubes van 300 g : 10 stuks (3 kg) ; 12 stuks (3.6 kg) ; 15 stuks (4.5 kg) ; 18 stuks (5.4 kg) ; 21 stuks (6.3 kg) ; 24 stuks (7.2 kg) ; 25 stuks (7.5 kg) ; 27 stuks (8.1 kg) ; 30 stuks (9 kg) ; 33 stuks (9.9 kg).

- voor tubes van 400 g: 8 stuks (3.2 kg) ; 10 stuks (4 kg) ; 12 stuks (4.8 kg) ; 15 stuks (6 kg) ; 18 stuks (7.2 kg) ; 21 stuks (8.4 kg) ; 24 stuks (9.6 kg) ; 25 stuks (10 kg).

4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden. Plaats de lokaaskisten in gebieden waar geen risico is op overstroming. Inspecteer regelmatig de lokaasdozen: bij de start van de behandeling om de 2-3 dagen, en daarna elke week, om te verzekeren dat het lokaas geaccepteerd wordt, de lokaasdozen onbeschadigd blijven en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

Vervang lokaas in lokaaskisten waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd.

Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Dit product niet direct in de muizengaten aanbrengen.

4.4.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaasstations dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.4.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

zie sectie 5.4

4.4.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

zie sectie 5.5

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

5.1.1 Professionele gebruikers met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.

Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.

Verwijder voedsel dat gemakkelijk bereikbaar is voor knaagdieren (bijv. gemorst graan of voedselafval).

Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.

Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem, met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden.

Aasstations dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, hollen enz.).

Waar mogelijk moeten aasstations aan de grond of andere structuren worden vastgemaakt.

Lokaasstations moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan).

Wanneer het product in openbare gebieden wordt gebruikt, dienen de behandelde gebieden tijdens de behandelperiode te worden gemarkeerd en moet bij het lokaas een mededeling beschikbaar worden gesteld waarin het risico op primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel wordt uitgelegd en de eerste maatregelen worden aangegeven die moeten worden genomen in geval van vergiftiging.

Het lokaas dient te worden vastgemaakt zodat het niet kan worden weggesleept van het lokaasstation.

Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.

Plaats het product uit de buurt van voedsel, drinken en diervoeder, en ook van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die daarmee in contact komen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Het aantal inspecties van de behandelde zone zal bepaald worden door de operatoren, rekening houdend met de aanbevolen frequenties.

Als de inname van het lokaas relatief laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van aasstations naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.

Als het lokaas na een behandelperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en er geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld.

Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdünnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdünnende rodenticide.

Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve bestrijdingsmaatregel.

Verwijder eventuele restanten met behulp van een spatel.

5.1.2 Professionele gebruikers

Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.

Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.

Verwijder voedsel dat gemakkelijk bereikbaar is voor knaagdieren (bijv. gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.

Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem, met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden.

Aasstations dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, hollen enz.).

Waar mogelijk moeten aasstations aan de grond of andere structuren worden vastgemaakt. Lokaasstations moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan).

Wanneer het product in openbare gebieden wordt gebruikt, dienen de behandelde gebieden tijdens de behandelperiode te worden gemarkeerd en moet bij het lokaas een mededeling beschikbaar worden gesteld waarin het risico op primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel wordt uitgelegd en de eerste maatregelen worden aangegeven die moeten worden genomen in geval van vergiftiging.

Het lokaas dient te worden vastgemaakt zodat het niet kan worden weggesleept van het lokaasstation.

Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten. Plaats het product uit de buurt van voedsel, drinken en diervoeder, en ook van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die daarmee in contact komen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Het aantal inspecties van de behandelde zone zal bepaald worden door de operatoren, rekening houdend met de aanbevolen frequenties.

Als de inname van het lokaas relatief laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van aasstations naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.

Als het lokaas na een behandelperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en er geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdünnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdünnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve bestrijdingsmaatregel.

Verwijder het resterende product en lokaasdozen aan het einde van de behandelperiode.

Verwijder eventuele restanten met behulp van een spatel.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

5.2.1 Professionele gebruikers met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

Informeert alle mogelijke omstaanders (gebruikers van de te behandelende zone en hun omgeving) van de ongediertebestrijdingscampagne.

In de productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) moet duidelijk worden vermeld dat het product enkel gebruikt mag worden door opgeleide professionele gebruikers die in het bezit zijn van een certificering die aantoont dat ze aan de vereiste opleidingsvereisten voldoen (bijv. "enkel voor opgeleide professionele gebruikers").

Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan voorkomen.

De producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de werkzaamheid van de behandeling.

Gebruik met het oog op resistentie management geen verschillende bloedverdünnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdünnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdünnend middel.

Reinig tussen het toepassen de lokaaskisten niet met water.

Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten [Dode knaagdieren moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

5.2.2 Professionele gebruikers

Informeert alle mogelijke omstaanders (gebruikers van de te behandelende zone en hun omgeving) van de ongediertebestrijdingscampagne.

Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen (minstens 2 keer per week)

De producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de werkzaamheid van de behandeling.

Gebruik lokaas dat werkzame bloedverdünnende stoffen bevat niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk te vermelden dat: "Het product mag niet aan het algemene publiek worden geleverd (bijv. "uitsluitend voor professionals")."

Het gebruik van dit middel moet resulteren in de eliminatie van de knaagdieren binnen 35 dagen. De productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) dient duidelijk aan te bevelen dat de gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.

Reinig tussen het toepassen de lokaaskisten niet met water.

Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten [Dode knaagdieren moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Bromadiolone is een antistollingsmiddel dat bloedingen kan veroorzaken. Het is mogelijk bij inname dat de bloeding pas enkele dagen na blootstelling aan het product optreedt. Mogelijke symptomen: neusbloedingen, bloedend tandvlees, blauwe plekken, bloed in stoelgang of urine.

Antigif: vitamine K1; mag uitsluitend door artsen of medisch personeel worden toegediend.

Bij blootstelling van de huid: was de huid met water en zeep.

Bij blootstelling van de ogen: de ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden ten minste tien minuten open houden.

Bij blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Indien inname: raadpleeg steeds een arts en hou de toon hem de label van het product.

Lokaasstations moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "productnaam of autorisatienummer"; "werkzame stof(fen)" en "bel in geval van een incident een gifcentrum [070/245245]".

Gevaarlijk voor dieren in het wild.

Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten [De verpakking en (ongegeten) restanten van rodenticiden worden beschouwd als gevaarlijke afval. Het afvoeren en vernietigen dient te gebeuren door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plek.

Plaats het product uit de buurt van voedsel, drinken en diervoeder, en ook van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die daarmee in contact komen. Bewaar buiten bereik van kinderen en dieren.

Houdbaarheid van 24 maanden.

6. Overige informatie

Vanwege de vertraagde werking kan het na consumptie van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdünnende rodenticiden effectief zijn.

Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.

Knaagdieren zijn ziektedragers. bij het verwijderen van dode knaagdieren wordt steeds aangeraden handschoenen te dragen.

De P-zinnen, zoals weergegeven op deze samenvatting van de productkenmerken, bevatten enkele fouten die niet aangepast kunnen worden. De correcte zinnen zijn: P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende nationale/regionale regelgeving.