

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Mosquito Milk Roll On 30% DEET

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: BE2015-0027

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: BE-0010075-0000

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	7
5.1. Consignes d'utilisation	7
5.2. Mesures de gestion des risques	7
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	7
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	8
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	8
6. Autres informations	8

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Moustimug Tropical Roller

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Perrigo Supply Chain International DAC
	Adresse	The Sharp Building - Hogan Place Dublin 2 Dublin Irlande
Numéro de l'autorisation	BE2015-0027	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	BE-0010075-0000	
Date de l'autorisation	01/08/2014	
Date d'expiration de l'autorisation	01/08/2024	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
Adresse du fabricant	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Allemagne

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Clariant Corporation
Adresse du fabricant	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly États-Unis
Emplacement des sites de fabrication	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly États-Unis
Substance active	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Vertellus Performance Materials Inc.
Adresse du fabricant	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis
Emplacement des sites de fabrication	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-méta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Substance active	134-62-3	205-149-7	30,95
Ethanol		Substance non active	64-17-5	200-578-6	31,43

2.2. Type de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger	<p>Liquide et vapeurs inflammables.</p> <p>Provoque des lésions oculaires graves.</p> <p>Contient isoeugenol, linalool, linalyl acetate. Peut produire une réaction allergique.</p>
--------------------------	---

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas respirer les vapeurs.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Produit répulsif contre les moustiques chez l'homme

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Produit répulsif contre les moustiques chez l'homme

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Culicidae:
Nom commun: Aedes mosquito
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Culicidae:
Nom commun: Anopheles mosquito
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Culicidae:
Nom commun: Culex mosquito
Stade de développement: Adultes

Domaine d'utilisation

Intérieur

Extérieur

En plein air ou dans un endroit bien aéré

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: roll-on

Description détaillée:

Utiliser ca. 1 ml par 600cm² de la peau (correspond à 1 ml par bras mâle adulte).

Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection.

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: 1 ml par 600 cm²
Dilution (%): 100
Nombre et fréquence des applications:

1 fois par jour

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

50 mL bouteille verre ou HDPE

Ouverture: 30 mm

Fermeture PP; PE montage avec PP balle

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Ce produit ne peut être utilisé pour repousser les moustiques pour protéger les gens.
Ce produit est destiné à un usage non-professionnel.
Ce produit fournit en moyenne 7 heures de protection contre les espèces de moustiques les plus courants en Belgique. Pour certaines espèces de moustiques tropicaux le temps de protection peut être beaucoup plus court: sur moyenne 4 heures contre le moustique de la fièvre jaune et de 6 heures contre le moustique vecteur du paludisme.
Des facteurs tels que la température, l'humidité et la transpiration peuvent affecter l'efficacité du produit.
Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection. Ne pas appliquer sur le visage.
Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée.
Eviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées.
Utilisez seulement en plein air ou dans un endroit bien aéré et ne pas inhaler les vapeurs.
Ne pas utiliser plus d'une fois par jour.
Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 13 ans.
Se laver les mains après utilisation.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Utilisez seulement en plein air ou dans un endroit bien aéré.
Ne pas utiliser plus d'une fois par jour.
Ne pas utiliser sur les enfants de 13 ans.

Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée.

Eviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées.

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri de l'humidité. Conserver hors de la portée des enfants. Bien fermer la bouteille. Durée de conservation de 5 ans.

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - Produit répulsif contre les tiques chez l'homme

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit répulsif contre les tiques chez l'homme
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Ixodidae: Nom commun: Ticks Stade de développement: Adultes Nom scientifique: Ixodidae: Nom commun: Ticks Stade de développement: Nymphes
Domaine d'utilisation	Intérieur Extérieur En plein air ou dans un endroit bien aéré
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: roll-on Description détaillée: Etendre délicatement et uniformément sur les parties non-couvertes du corps: tête, cou, mains (paumes et dessus), avant-bras, partie inférieures de la jambe, pieds et 70% des parties supérieures des bras et des cuisses. Cela correspond à une tenue normale pour l'extérieur (t-shirt à manches courtes).

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: -
Dilution (%): 100
Nombre et fréquence des applications:
Lorsque le produit doit être réappliqué, veuillez respecter le nombre maximum d'application par jour:

Trois fois par jour pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans

Deux fois par jour pour les enfants âgés entre 2 et 12 ans

Une fois par jour chez les enfants âgés de moins de 2 ans

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

50 mL bouteille verre ou HDP

Ouverture: 30 mm

Fermeture PP; PE montage avec PP balle

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Ce produit ne peut être utilisé pour repousser les tiques pour protéger les gens.

Ce produit est destiné à un usage non-professionnel.

Ce produit fournit en moyenne 6 heures de protection contre les tiques

Des facteurs tels que la température, l'humidité et la transpiration peuvent affecter l'efficacité du produit.

Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection. Ne pas appliquer sur le visage.

Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée.

Éviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées.

Utilisez seulement en plein air ou dans un endroit bien aéré et ne pas inhaler les vapeurs.

Utilisez les répulsifs en toute sécurité. Veuillez à lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas appliquer sur les coupures, blessures, la peau fraîchement rasée ou irritée. Uniquement pour usage externe.

N'utiliser pas sous les vêtements. N'appliquez pas sur les vêtements.

Se laver les mains après utilisation.

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

N'appliquer que sur les parties non-couvertes du corps. Ne pas appliquer sur tout le corps. Privilégiez toujours la protection mécanique (moustiquaire, vêtements longs, t-shirts à manches longues et pantalons). Ne pas utiliser en dessous des vêtements.

Se laver les mains avant de manipuler de la nourriture. Ne pas appliquer directement ou à proximité de nourriture ou de boisson, ou sur des surfaces ou des ustensiles susceptibles d'être en contact direct avec de la nourriture ou des boissons. Pour éviter la contamination, éviter le contact de la peau traitée avec la nourriture.

Un adulte doit appliquer le produit sur les enfants de moins de 12 ans.

Éviter de respirer les vapeurs. Ne pas appliquer directement sur le visage. Utilisez seulement en plein air ou dans un endroit bien aéré.

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri de l'humidité.

Conserver hors de la portée des enfants.

Bien fermer la bouteille.

Durée de conservation de 5 ans.

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

Voir mesure de mitigation spécifique à l'utilisation

5.2. Mesures de gestion des risques

Voir mesure de mitigation spécifique à l'utilisation

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir: instruction spécifiques d'utilisation, détails des effets directs ou indirects probables, premiers secoursInstructions et mesures immédiates pour protéger l'environnement

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Voir: instruction spécifique d'utilisation, instructions pour une élimination sûre du produit et de son emballage

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir : instructions spécifique d'utilisaton, conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

6. Autres informations