

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: RENTOKIL RAPID PRO

Productsoort(en): PT 14 - Rodenticiden

Toelatingsnummer: BE2016-0006

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0011978-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies	4
4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen	4
4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen	5
4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	5
4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	5
5. Algemene gebruiksaanwijzing	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	6
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	6
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	6
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	6
6. Overige informatie	7

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

RENTOKIL RAPID PRO

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Rentokil Initial
	Adres	The Power Centre, Unit A1 & A2, Link 10 Napier Way RH10 9RA Crawley Verenigd Koninkrijk
Toelatingsnummer		BE2016-0006
Referentienummer van de asset in R4BP 3		BE-0011978-0000
Toelatingsdatum		07/10/2016
Vervaldatum		06/10/2026

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Rentokil Initial 1927 plc	
Adres van de fabrikant	Power Centre, Unit A1 and A2, Link 10, Napier Way RH10 9RA Crawley West Sussex Verenigd Koninkrijk	
Productielocatie	Rentokil Initial Supplies, Webber Road Merseyside Verenigd Koninkrijk	Knowsley Industrial Park L33 7SR Kirkby,

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	3 - Alfachloralose
Naam van de fabrikant	Physalys SARL,
Adres van de fabrikant	3 Rue de L'Arrivee, BP215-F75749. Cedex 15 Paris. Frankrijk
Productielocatie	3 Rue de L'Arrivee, BP215-F75749. Cedex 15 Paris Frankrijk
Werkzame stof	3 - Alfachloralose
Naam van de fabrikant	LODI SAS
Adres van de fabrikant	Parc D Activites Des 4 Routes 35390 Grand-Fougeray Frankrijk
Productielocatie	LODI Group, site HIKAL Ltd., T-21. MIDC Industrial Area Talaja Raigad district 410208 Maharashtra Indië

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Alfachloralose	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Werkzame stof	15879-93-3	240-016-7	3.996

2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
-------------------------	--

Veiligheidsaanbevelingen

Voorkom lozing in het milieu.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
verpakking afvoeren naar volgens de lokale en regionale reglementering

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Binnen in gebouwen. Voor het bestrijden van muizen.

Productsoort	PT 14 - Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet van toepassing (PT14 - rodenticiden).
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Mus musculus-Huismuis-Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren) Mus musculus-HuismuisJuvenielen
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	In lokdozen -
Dosering en frequentie van de toepassing	Tot 8g lokaas (2 x 4g) aangebracht met een spuitpistool - 0.0 - Het aantal te gebruiken lokaasdozen is afhankelijk van de behandelde site en ernst van de infestatie: als richtlijn Plaats de lokaasdozen op een afstand van 2 tot 3 meter van elkaar (3 meter in geval van een kleine infestatie tot 2 meter in geval van een hoge muizen infestatie) Controleer de lokaasdozen regelmatig Vervang elk opgegeten lokaas Vervang elk beschimmeld of vervuild lokaas Als al het lokaas opgegeten werd verhoog het aantal lokaasdozen en/of de bezoekfrequentie Het lokaas vervangen tot er in het geheel geen opname meer is Lokazen moeten geplaatst worden voor ten hoogste 7 tot 10 dagen Indien de infestatie niet onder controle gebracht wordt, moet de site opnieuw onderzocht worden om de oorzaak te bepalen en overweeg herinrichting van de lokazen of het aantal lokazen te verhogen

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

tube, Plastiek: HDPE , 300g
tube, Plastiek: HDPE , 400g

400g in polyethyleen (HDPE) patronen

300g in polyethyleen (HDPE) patronen

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Lees voor elk gebruik steeds het etiket en volg de instructies

Het product moet op een weloverwogen wijze geplaatst worden

Een grondige inspectie van de geïnfesteerde zone is essentieel, in het bijzonder in afgelegen en verborgen plaatsen, om de grootte van de infestatie te bepalen.

Was uw handen en rechtstreeks blootgestelde huid na het hanteren van het product voor het eten, drinken en roken

Plaats de lokaasdozen op locaties waar muizen gezien worden in of nabij gangen en schuilplaatsen; op looppaden en in de buurt van de plaatsen waar ze eten of knagen

Het lokaas moet in lokaasdozen geplaatst worden, buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren en andere niet-doeldieren

Op lokaasdozen moeten duidelijk de vermelding aangebracht worden dat ze rodenticiden bevatten en niet mogen aangeraakt worden

Na de behandeling alle lokazen verwijderen

Wanneer de muizenplaag onder controle is, overweeg beheersmaatregelen (gaten dichtmaken, mogelijke voedselbronnen verwijderen e.d.) om het risico op een nieuwe infestatie te verminderen

Optimale efficiëntie wordt bereikt bij lage omgevings-temperaturen d.w.z. bij voorkeur 16°C of lager dan 16°C.

Product is werkzaam vanaf 24 uur tot 48 uur.

Dode knaagdieren, overblijfselen van niet gebruikt lokaas of lokaas gevonden buiten de lokaasdozen moeten verzameld worden bij elke controle om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere niet-doeldieren te beperken

Dode knaagdieren, overblijfselen van niet gebruikt lokaas of welke restanten van lokaas dan ook moeten in overeenstemming met de lokale reglementen afgevoerd en verwerkt worden.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Plaats geen lokaasdozen dichtbij waterafvoersystemen waar ze in contact kunnen komen met water

Om de opname van lokaas te bevorderen, zorg ervoor dat alternatieve voedingsbronnen verwijderd worden waar dat mogelijk is

Gebruik het product niet waar het in contact kan komen met voeding, drinkwater, diervoeding of voorwerpen die in contact komen met voeding

Lokaasdozen niet schoonmaken tussen toepassingen

Knaagdieren kunnen dragers zijn van ziektekiemen (bv. Leptospirose). Draag beschermende handschoenen bij het verwijderen van knaagdieren.

Minimale informatie te vermelden op de lokaasdozen voor opgeleide professionelen: Naam en telefoonnummer van het bedrijf verantwoordelijk voor de behandeling, productnaam en maximale hoeveelheid gebruikt in de lokaasdoos, naam en concentratie v.h. actief ingrediënt en de tekst : 'In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt raadpleeg een geneesheer of contacteer het Antigifcentrum, Militair Hospitaal Koningin Astrid, Bruynstraat 1 - 1120 Brussel (070/245.245)

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Inslikken van dit middel in grote hoeveelheden kan leiden tot onderdrukking van het zenuwstelsel, hoofdpijn en zwakte die uitmondt in bewusteloosheid. Geen tegengif beschikbaar. Symptomatische behandeling. Bij inslikken raadpleeg onmiddellijk een arts en toon hem/haar deze verpakking of het etiket.

Voor informatie of om een incident te melden contacteer het Antigifcentrum, Militair Hospitaal Koningin Astrid, Bruynstraat 1 - 1120 Brussel (070/245.245), bewaar het etiket als referentie

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijder na behandeling alle lokaas en voer deze af in overeenstemming met de lokale en regionale voorschriften

Product en verpakkingen afvoeren in overeenstemming met de lokale en regionale voorschriften

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Product bewaren in de originele verpakking op een koele en droge plaats

Product buiten het bereik houden van kinderen en niet-doeldieren

Verwijderd houden van voedsel, drank en dierenvoeding

Het product is 12 maanden houdbaar

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Lees voor elk gebruik steeds het etiket en volg de instructies

Het product moet op een weloverwogen wijze geplaatst worden

Een grondige inspectie van de geïnfecteerde zone is essentieel, in het bijzonder in afgelegen en verborgen plaatsen, om de grootte van de infestatie te bepalen.

Was uw handen en rechtstreeks blootgestelde huid na het hanteren van het product voor het eten, drinken en roken

Plaats de lokaasdozen op locaties waar muizen gezien worden in of nabij gangen en schuilplaatsen; op looppaden en in de buurt van de plaatsen waar ze eten of knagen

Het lokaas moet in lokaasdozen geplaatst worden, buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren en andere niet-doeldieren

Op lokaasdozen moeten duidelijk de vermelding aangebracht worden dat ze rodenticiden bevatten en niet mogen aangeraakt worden

Na de behandeling alle lokazen verwijderen

Wanneer de muizenplaag onder controle is, overweeg beheersmaatregelen (gaten dichtmaken, mogelijke voedselbronnen verwijderen e.d.) om het risico op een nieuwe infestatie te verminderen

Optimale efficiëntie wordt bereikt bij lage omgevings-temperaturen d.w.z. bij voorkeur 16°C of lager dan 16°C.

Product is werkzaam vanaf 24 uur tot 48 uur.

Dode knaagdieren, overblijfselen van niet gebruikt lokaas of lokaas gevonden buiten de lokaasdozen moeten verzameld worden bij elke controle om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere niet-doeldieren te beperken

Dode knaagdieren, overblijfselen van niet gebruikt lokaas of welke restanten van lokaas dan ook moeten in overeenstemming met de lokale reglementen afgevoerd en verwerkt worden.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Plaats geen lokaasdozen dichtbij waterafvoersystemen waar ze in contact kunnen komen met water

Gebruik het product niet waar het in contact kan komen met voeding, drinkwater, diervoeding of voorwerpen die in contact komen met voeding

Lokaasdozen niet schoonmaken tussen toepassingen

Knaagdieren kunnen dragers zijn van ziektekiemen (bv. Leptospirose). Draag beschermende handschoenen bij het verwijderen van knaagdieren. (type moet door de toelatinghouder in de productinformatie vermeld worden)

Als het product op openbare plaatsen gebruikt wordt, moeten de behandelde plaatsen tijdens de behandeling gemarkeerd worden en de mogelijke risico's voor mensen en niet-doeldieren (d.w.z. primaire en secundaire vergiftiging) vermeld te worden evenals de noodzakelijke eerstehulp maatregelen in geval van een vergiftiging

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Inslikken van dit middel in grote hoeveelheden kan leiden tot onderdrukking van het zenuwstelsel, hoofdpijn en zwakte die uitmondt in bewusteloosheid. Geen tegengif beschikbaar. Symptomatische behandeling. Bij inslikken raadpleeg onmiddellijk een arts en toon hem/haar deze verpakking of het etiket.

Gelekte/gemorste stof opruimen. Zorg ervoor dat het product of de lege verpakking niet in de bodem, in waterwegen of in het oppervlaktewater terecht komt.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijder na behandeling alle lokaas en voer deze af in overeenstemming met de lokale en regionale voorschriften

Product en verpakkingen afvoeren in overeenstemming met de lokale en regionale voorschriften

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Product bewaren in de originele verpakking op een koele en droge plaats

Product buiten het bereik houden van kinderen en niet-doeldieren

Verwijderd houden van voedsel, drank en diervoeding

Het product is 12 maanden houdbaar

6. Overige informatie