FR

ANNEXE

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

Rodex G Bloc

Type(s) de produit

TP14: Rodenticides

Numéro d'autorisation: BE2013-0017

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: BE-0000425-0000

Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	Rodex G Bloc
---------------------------------	--------------

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	PelGar International Limited
	Adresse	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon France
Numéro de l'autorisation	BE2013-0017	
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>	BE-0000425-0000	
Date de l'autorisation	17/10/2012	
Date d'expiration de l'autorisation	23/06/2030	

1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	PelGar International Limited
Adresse du fabricant	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon France
Emplacement des sites de fabrication	PelGar International Limited site 1 Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord PelGar International Limited site 2 Promedivet SRL, str. Lunga nr. 46/G 545500 SOVATA Roumanie

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	Bromadiolone
Nom du fabricant	PelGar International Limited
Adresse du fabricant	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Emplacement des sites de fabrication	PelGar International Limited site 1 Prazska 54 280 02 Kolin Tchéquie

Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Bromadiolone	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Substance active	28772-56-7	249-205-9	0,005 % (p/p)
Octhilinone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazol-3-one	2-N-Octyl-4-isothiazolin-3-one	Substance non active	26530-20-1	247-761-7	0,000169 % (p/p)

2.2. Type(s) de formulation

RB Appât (prêt à l'emploi)

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	<p>H360D: Peut nuire au fœtus.</p> <p>H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes (blooc) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée {1:indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger: }.</p> <p>H317: Peut provoquer une allergie cutanée.</p> <p>EUH208: Contient du (de la) 1,2-benzisothiazolin-3-one and 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique.</p>
Conseils de prudence	<p>P201: Se procurer les instructions avant utilisation.</p> <p>P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et comprises toutes les précautions de sécurité.</p> <p>P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation.</p> <p>P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.</p> <p>P280: Porter des gants protecteurs.</p> <p>P280: Porter des vêtements protecteurs.</p> <p>P280: Porter une protection pour les yeux.</p> <p>P280: Porter une protection pour le visage.</p> <p>P308 + P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.</p> <p>P314: Consulter un médecin en cas de malaise.</p> <p>P405: Garder sous clé.</p> <p>P501: Éliminer conformément aux instructions dans {1:...}.</p>

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1. Description de l'utilisation

Tableau 1.

Souris domestiques et rats – réservé aux professionnels ayant des compétences avancées démontrées – intérieur

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Non applicable pour rodenticides
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Mus musculus</i> Nom commun: house mouse Stade de développement: - Adultes et juvéniles Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: brown rat Stade de développement: - Adultes et juvéniles
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. - Points d'appâts couverts et protégés
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Nombre et fréquence des applications: Rats:-200 g d'appât par point d'appât Souris:-40 g d'appât par point d'appât
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels formés
Dimensions et matériaux d'emballage	Blocs de 1 ou 2 x 20 g dans une station d'appâtage pour souris en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg. Blocs de 1 ou 2 x 15 g dans une station d'appâtage pour souris en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg. Blocs de 10,11 ou 12 x 15 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg. Blocs de 8, 9 ou 10 x 20 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3

ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg.

Blocs de 1 ou 2 x 100 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 15 kg.

Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans une cuve ou un seau en polyéthylène ou en polypropylène - 3kg à 20 kg.

Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans des cartons à double paroi ou en carton - de 3kg à 20 kg.

Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans un sac en plastique ou en polyéthylène (attaché à un fil) dans un carton à double paroi ou en carton - 3kg à 20 kg.

Blocs de 5g, 10g, 15g, 20g ou 28g dans:

- carton
- sachets (polyéthylène, papier / polyéthylène, polypropylène orienté, polyéthylène / aluminium ou papier / polyéthylène / aluminium)
- poches (papier / polyéthylène / aluminium, polypropylène, PET / polyéthylène ou polypropylène laminé)
- blisters (polypropylène)

- 3 kg à 3,1 kg

20 g de blocs emballés en uni-plateaux emballés en cartons - 3 kg à 12 kg.

15 g de blocs emballés sur des plateaux en carton avec une pellicule de cellophane, puis emballés en cartons - Entre 3 kg et 20 kg.

20 g de blocs emballés sur des plateaux en carton avec une pellicule de cellophane, puis emballés en cartons - Entre 3 kg et 20 kg.

4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.
- [Le cas échéant] Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

-Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation [conformément au code de bonnes pratiques en vigueur, le cas échéant].

- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable.

[À moins que le produit ne soit explicitement autorisé conformément aux annexes 1 ou 2 du CA-March23-Doc4.15, et pour les substances actives pour lesquelles des appâts permanents ou pulsés sont autorisés]:

- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou pour surveiller les activités des rongeurs.
- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.

Pour les produits de contact uniquement :

- Ce produit ne doit être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles, si la lutte non-chimique ou les formulations d'appâtage traditionnelles s'avèrent inefficaces.
- Ce produit ne doit être utilisé que pour un usage intérieur et dans des endroits qui sont hors de la portée des enfants, des animaux de compagnie ou des animaux non ciblés.

4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

4.2. Description de l'utilisation

Tableau 2.

Souris et rats – professionnels ayant des compétences avancées démontrées – extérieur autour de bâtiments

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Non applicable pour rodenticides
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Mus musculus</i> Nom commun: house mouse Stade de développement: - Adultes et juvéniles Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: brown rat Stade de développement: - Adultes et juvéniles
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en extérieur Extérieur autour de bâtiments
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.

	<p>- Points d'appâts couverts et protégés</p> <p>- Application directe d'appâts prêts à l'emploi dans le terrier.</p>
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	<p>Nombre et fréquence des applications:</p> <p>Rats:- 200 g d'appât par point d'appât</p> <p>Souris: - 40 g d'appât par point d'appât</p> <p>Appâtage dans terrier: 20-200 g d'appât par terrier</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels formés
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Blocs de 1 ou 2 x 20 g dans une station d'appâtage pour souris en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg.</p> <p>Blocs de 1 ou 2 x 15 g dans une station d'appâtage pour souris en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg.</p> <p>Blocs de 10,11 ou 12 x 15 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg.</p> <p>Blocs de 8, 9 ou 10 x 20 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg.</p> <p>Blocs de 1 ou 2 x 100 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 15 kg.</p> <p>Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans une cuve ou un seau en polyéthylène ou en polypropylène - 3kg à 20 kg.</p> <p>Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans des cartons à double paroi ou en carton - de 3kg à 20 kg.</p> <p>Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans un sac en plastique ou en polyéthylène (attaché à un fil) dans un carton à double paroi ou en carton - 3kg à 20 kg.</p> <p>Blocs de 5g, 10g, 15g, 20g ou 28g dans:</p> <ul style="list-style-type: none"> • carton • sachets (polyéthylène, papier / polyéthylène, polypropylène orienté, polyéthylène / aluminium ou papier / polyéthylène / aluminium)

	<ul style="list-style-type: none"> • poches (papier / polyéthylène / aluminium, polypropylène, PET / polyéthylène ou polypropylène laminé) • blisters (polypropylène) <p>- 3 kg à 3,1 kg</p> <p>20 g de blocs emballés en uni-plateaux emballés en cartons - 3 kg à 12 kg.</p> <p>15 g de blocs emballés sur des plateaux en carton avec une pellicule de cellophane, puis emballés en cartons - Entre 3 kg et 20 kg.</p> <p>20 g de blocs emballés sur des plateaux en carton avec une pellicule de cellophane, puis emballés en cartons - Entre 3 kg et 20 kg.</p>
--	--

4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Remplacer tout appât dans les points d'appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement [Non applicable si clairement autorisé selon l'addendum 4 du CA-March23-Doc4.15].
- [Le cas échéant] Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation [conformément au code de bonnes pratiques en vigueur, le cas échéant].
- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable.
- [À moins que le produit ne soit explicitement autorisé conformément aux annexes 1 ou 2 du CA-March23-Doc4.15, et pour les substances actives pour lesquelles des appâts permanents ou pulsés sont autorisés]
- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou pour surveiller les activités des rongeurs.
- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.
- [Sauf autorisation explicite conformément à l'addendum 4 du CA-March23-Doc4.15]: Ne pas placer directement ce produit dans les terriers.

4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité d'eaux de surfaces ou de systèmes d'évacuation des eaux, (rivières, étangs, canaux d'eau, digues, fossés d'irrigation) s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

4.3. Description de l'utilisation

Tableau 3.

Rats - Réserve aux professionnels ayant des compétences avancées démontrées - Zones ouvertes extérieures et décharges

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Non applicable pour rodenticides
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: brown rat Stade de développement: - Adultes et juvéniles
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en extérieur Zones ouvertes extérieures et décharges
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. - Points d'appâts couverts et protégés - Application directe d'appâts prêts à l'emploi dans le terrier.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Nombre et fréquence des applications: 200 g d'appât par point d'appât. - Forte infestation : 200 g d'appât par point d'appâtage tous les 5 m. - Faible infestation : 200 g d'appât par point d'appât tous les 10 mètres. Appâtage dans terrier: 20-200 g d'appât par terrier.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels formés
Dimensions et matériaux d'emballage	Blocs de 10,11 ou 12 x 15 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg Blocs de 8, 9 ou 10 x 20 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg. Blocs de 1 ou 2 x 100 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4

	<p>en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 15 kg.</p> <p>Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans une cuve ou un seau en polyéthylène ou en polypropylène - 3kg à 20 kg.</p> <p>Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans des cartons à double paroi ou en carton - de 3kg à 20 kg.</p> <p>Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans un sac en plastique ou en polyéthylène (attaché à un fil) dans un carton à double paroi ou en carton - 3kg à 20 kg.</p> <p>Blocs de 5g, 10g, 15g, 20g ou 28g dans:</p> <ul style="list-style-type: none"> • carton • sachets (polyéthylène, papier / polyéthylène, polypropylène orienté, polyéthylène / aluminium ou papier / polyéthylène / aluminium) • poches (papier / polyéthylène / aluminium, polypropylène, PET / polyéthylène ou polypropylène laminé) • blisters (polypropylène) <p>- 3 kg à 3,1 kg</p> <p>20 g de blocs emballés en uni-plateaux emballés en cartons - 3 kg à 12 kg.</p> <p>15 g de blocs emballés sur des plateaux en carton avec une pellicule de cellophane, puis emballés en cartons - Entre 3 kg et 20 kg.</p> <p>20 g de blocs emballés sur des plateaux en carton avec une pellicule de cellophane, puis emballés en cartons - Entre 3 kg et 20 kg.</p>
--	---

4.3.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Remplacer tout appât dans les points d'appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement [Non applicable si clairement autorisé selon l'addendum 4 du CA-March23-Doc4.15].
- [Le cas échéant] Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

4.3.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation [conformément au code de bonnes pratiques en vigueur, le cas échéant].

- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable.

[À moins que le produit ne soit explicitement autorisé conformément aux annexes 1 ou 2 du CA-March23-Doc4.15, et pour les substances actives pour lesquelles des appâts permanents ou pulsés sont autorisés]

- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou pour surveiller les activités des rongeurs.

- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.

- [Sauf autorisation explicite conformément à l'addendum 4 du CA-March23-Doc4.15]: Ne pas placer directement ce produit dans les terriers.

4.3.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité d'eaux de surfaces ou de systèmes d'évacuation des eaux, (rivières, étangs, canaux d'eau, digues, fossés d'irrigation) s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

4.3.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

4.3.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

4.4. Description de l'utilisation

Tableau 4.

Rats – réservé aux professionnels ayant des compétences avancées démontrées – égouts

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Non applicable pour rodenticides
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: brown rat Stade de développement: - Adultes et juvéniles
Domaine(s) d'utilisation	égouts
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Appât prêt à l'emploi à fixer ou appliquer dans des postes d'appâtage pour empêcher l'appât d'entrer en contact avec les eaux usées. - Points d'appâts couverts et protégés.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Nombre et fréquence des applications: 200 g par point d'appât (bouche d'égout)
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels formés
Dimensions et matériaux d'emballage	Blocs de 10,11 ou 12 x 15 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à

usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg.

Blocs de 8, 9 ou 10 x 20 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg.

Blocs de 1 ou 2 x 100 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 15 kg.

Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans une cuve ou un seau en polyéthylène ou en polypropylène - 3kg à 20 kg.

Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans des cartons à double paroi ou en carton - de 3kg à 20 kg.

Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans un sac en plastique ou en polyéthylène (attaché à un fil) dans un carton à double paroi ou en carton - 3kg à 20 kg.

Blocs de 5g, 10g, 15g, 20g ou 28g dans:

- carton
- sachets (polyéthylène, papier / polyéthylène, polypropylène orienté, polyéthylène / aluminium ou papier / polyéthylène / aluminium)
- poches (papier / polyéthylène / aluminium, polypropylène, PET / polyéthylène ou polypropylène laminé)
- blisters (polypropylène)

- 3 kg à 3,1 kg

20 g de blocs emballés en uni-plateaux emballés en cartons - 3 kg à 12 kg.

15 g de blocs emballés sur des plateaux en carton avec une pellicule de cellophane, puis emballés en cartons - Entre 3 kg et 20 kg.

20 g de blocs emballés sur des plateaux en carton avec une pellicule de cellophane, puis emballés en cartons - Entre 3 kg et 20 kg.

4.4.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Les appâts doivent être appliqués de façon à ne pas entrer en contact avec l'eau et à ne pas être emportés.
- [Le cas échéant] Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

4.4.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

[Si la politique ou la législation nationale l'exige] Placer uniquement les appâts dans des égouts reliés à une station de traitement des eaux usées.

N'utilisez pas le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.

4.4.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

4.4.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

4.4.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

4.5. Description de l'utilisation

Tableau 5.
Rats – Professionnels - Intérieur

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Non applicable pour rodenticides
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: brown rat Stade de développement: - Adultes et juvéniles
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Nombre et fréquence des applications: 200 g d'appât par point d'appât. Si plus d'un poste d'appâtage est nécessaire, la distance minimale entre les postes d'appâtage doit être de 5 à 10 mètres.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Blocs de 10,11 ou 12 x 15 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg. Blocs de 8, 9 ou 10 x 20 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg.

Blocs de 1 ou 2 x 100 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 15 kg.

Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans une cuve ou un seau en polyéthylène ou en polypropylène - 3kg à 20 kg.

Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans des cartons à double paroi ou en carton - de 3kg à 20 kg.

Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans un sac en plastique ou en polyéthylène (attaché à un fil) dans un carton à double paroi ou en carton - 3kg à 20 kg.

Blocs de 5g, 10g, 15g, 20g ou 28g dans:

- carton
- sachets (polyéthylène, papier / polyéthylène, polypropylène orienté, polyéthylène / aluminium ou papier / polyéthylène / aluminium)
- poches (papier / polyéthylène / aluminium, polypropylène, PET / polyéthylène ou polypropylène laminé)
- blisters (polypropylène)

- 3 kg à 3,1 kg

20 g de blocs emballés en uni-plateaux emballés en cartons - 3 kg à 12 kg.

15 g de blocs emballés sur des plateaux en carton avec une pellicule de cellophane, puis emballés en cartons - Entre 3 kg et 20 kg.

20 g de blocs emballés sur des plateaux en carton avec une pellicule de cellophane, puis emballés en cartons - Entre 3 kg et 20 kg.

4.5.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Les postes d'appâtage ne doivent être inspectés que 5 à 7 jours après le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

- [Le cas échéant] Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

4.5.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

4.5.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

4.5.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

4.5.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

4.6. Description de l'utilisation

Tableau 6.
Souris et rats – professionnels – extérieur autour de bâtiments

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Non applicable pour rodenticides
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Mus musculus</i> Nom commun: house mouse Stade de développement: - Adultes et juvéniles Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: brown rat Stade de développement: - Adultes et juvéniles
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en extérieur Extérieur autour de bâtiments
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Nombre et fréquence des applications: Rats : - Forte infestation : 200 g d'appât par point d'appât tous les 5 m. - Faible infestation : 200 g d'appât par point d'appât tous les 10 m. Souris : - Forte infestation : 40 g d'appât par point d'appât tous les 2 m. - Faible infestation : 40 g d'appât par point d'appât tous les 5 m.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Blocs de 1 ou 2 x 20 g dans une station d'appâtage pour souris en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg.

Blocs de 1 ou 2 x 15 g dans une station d'appâtage pour souris en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg.

Blocs de 10,11 ou 12 x 15 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg.

Blocs de 8, 9 ou 10 x 20 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 20 kg.

Blocs de 1 ou 2 x 100 g dans une station d'appâtage pour rats en PEHD ou en polypropylène inviolable (rechargeable ou à usage unique). Les stations d'appâts emballées en unités de 1, 2, 3 ou 4 en carton extérieur. Emballé en multipacks de 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 - Entre 3 kg et 15 kg.

Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans une cuve ou un seau en polyéthylène ou en polypropylène - 3kg à 20 kg.

Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans des cartons à double paroi ou en carton - de 3kg à 20 kg.

Blocs en vrac de 5g, 10g, 15g, 20g, 28g ou 100g dans un sac en plastique ou en polyéthylène (attaché à un fil) dans un carton à double paroi ou en carton - 3kg à 20 kg.

Blocs de 5g, 10g, 15g, 20g ou 28g dans:

- carton
- sachets (polyéthylène, papier / polyéthylène, polypropylène orienté, polyéthylène / aluminium ou papier / polyéthylène / aluminium)
- poches (papier / polyéthylène / aluminium, polypropylène, PET / polyéthylène ou polypropylène laminé)
- blisters (polypropylène)

- 3 kg à 3,1 kg

20 g de blocs emballés en uni-plateaux emballés en cartons - 3 kg à 12 kg.

15 g de blocs emballés sur des plateaux en carton avec une pellicule de cellophane, puis emballés en cartons - Entre 3 kg et 20 kg.

20 g de blocs emballés sur des plateaux en carton avec une pellicule de cellophane, puis emballés en cartons - Entre 3 kg et 20 kg.

4.6.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques (par exemple, de la pluie, de la neige, etc.). Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Les postes d'appâtage doivent être inspectés [pour les souris - au minimum tous les 2 à 3 jours au] [pour les rats - seulement 5 à 7 jours après le] début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Rechargez le poste d'appâtage au besoin.
- Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- [Le cas échéant] Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné

4.6.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Ne placer pas directement ce produit dans les terriers.

4.6.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité d'eaux de surfaces ou de systèmes d'évacuation des eaux, (rivières, étangs, canaux d'eau, digues, fossés d'irrigation) s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

4.6.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

4.6.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION¹

5.1. Consignes d'utilisation

Professionnels

- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.

- Avant de placer un appât, mener un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation.

- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires).

Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.

- Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle.

- Envisagez la mise en oeuvre de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.

- Les stations d'appât doivent être placées à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée précédemment (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.).

- Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.

- Les postes d'appâtage doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils contiennent des rodenticides et qu'ils ne doivent être ni déplacés ni ouverts (se reporter à la section 5.3 pour connaître les informations devant figurer sur l'étiquette).

- [Si requis par la politique ou la législation nationale] Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts.

- L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être traîné à l'extérieur du poste d'appâtage.

- Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non ciblés.

- Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers.

- [Lorsque cela est requis par l'évaluation des risques]:

- Portez des gants de protection résistant aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).

- Porter une combinaison de protection imperméable au produit biocide (le matériau de la combinaison à préciser par le titulaire de l'autorisation dans les informations relatives au produit) pendant le chargement et le nettoyage de la station d'appâtage.

- Porter un écran facial pendant le chargement et le nettoyage du poste d'appâtage.

- Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit.

Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.

- Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appât à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât.

Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable.

Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants: dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de lutte alternative.

- Retirer tout appât restant ou les postes d'appât au terme de la période de traitement.

Mode d'emploi «spécifique selon l'appât»:

Appât en sachets: Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Professionnels ayant des compétences avancées démontrées

¹Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

-
- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.
 - Avant de placer un appât, mener un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation.
 - Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.
 - Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle.
 - Le produit doit être placé à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, sites d'alimentation, trous, terriers, etc.)
 - Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.
 - Les postes d'appâtage doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils contiennent des rodenticides et qu'ils ne doivent être ni déplacés ni ouverts (se reporter à la section 5.3 pour connaître les informations devant figurer sur l'étiquette).
 - [Si la politique nationale ou la législation l'exige] Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une notice expliquant le risque d'intoxication primaire ou secondaire par l'anticoagulant, ainsi que les premières mesures à prendre en cas d'intoxication, doit être placée à proximité des appâts.
 - L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être traîné à l'extérieur du poste d'appâtage.
 - L'appât doit être fixé de manière à ce qu'il ne puisse pas être retiré du poste d'appâtage.
 - Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles.
 - Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers.
- [Lorsque cela est requis par l'évaluation des risques]:
- Portez des gants de protection résistant aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).
 - Porter une combinaison de protection imperméable au produit biocide (le matériau de la combinaison à préciser par le titulaire de l'autorisation dans les informations relatives au produit) pendant le chargement et le nettoyage de la station d'appâtage.
 - Porter un écran facial pendant le chargement et le nettoyage du poste d'appâtage.
 - Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.
 - L'utilisateur détermine lui-même la fréquence des inspections de la zone traitée, à la lumière des résultats de l'étude réalisée au début du traitement. Cette fréquence doit être compatible avec les recommandations contenues dans le code de bonnes pratiques applicable.
 - Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appât à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât.
 - Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable. Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants: dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de lutte alternative.
- Mode d'emploi «spécifique selon l'appât»:
- Appât en sachets: Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

5.2. Mesures de gestion des risques

Professionnels

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation

- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement (par exemple, au moins deux fois par semaine) [Le cas échéant, préciser si une inspection plus fréquente ou quotidienne est nécessaire].

- Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.

- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.

- Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent clairement indiquer les éléments suivants:

Le produit ne doit pas être fourni au grand public (par exemple, «à usage professionnel uniquement»).

le produit doit être utilisé dans des points d'appât adéquats et inviolables (par exemple, « utiliser uniquement dans des points d'appât inviolables »).

Les utilisateurs doivent étiqueter correctement les postes d'appâtage avec les informations mentionnées à la section 5.3 du SPC (par exemple, « étiqueter les postes d'appâtage conformément aux recommandations du produit »).

- L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent recommander de façon claire qu'en cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles.

- Ne pas nettoyer les postes d'appâtage à l'eau entre deux applications.

- Éliminer les cadavres des rongeurs conformément à la réglementation locale.

Professionnels ayant des compétences avancées démontrées

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels de la campagne de dératisation [conformément au code de bonnes pratiques applicable, le cas échéant].

- Les informations sur le produit (étiquette et/ou notice) doivent clairement indiquer que le produit est destiné uniquement aux utilisateurs professionnels formés et titulaires d'une certification attestant du respect des exigences de formation applicables (par exemple, « réservé aux professionnels formés »).

- Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut suspecter une résistance à la substance active.

- Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement [sauf si autorisé en appâtage permanent].

- Ne pas alterner l'utilisation de différents anticoagulants d'efficacité comparable ou inférieure aux fins de la gestion de la résistance. Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant.

- Ne pas laver à l'eau les postes d'appâtage ou les ustensiles utilisés dans les postes d'appâtage couverts et protégés, entre les applications.

- Éliminer les rongeurs morts conformément à la réglementation locale.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.

- Antidote: Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

EN CAS D'EXPOSITION OU D'INQUIÉTUDE : Consulter un médecin.

EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche.

En cas de symptômes : Appeler le 112/une ambulance pour obtenir une assistance médicale.

En l'absence de symptômes : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Informations destinées au personnel soignant/médecin : Instaurer les mesures de réanimation si nécessaire, puis appeler un CENTRE ANTIPOISON.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : En cas de symptômes, rincer abondamment à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver la peau à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin.

Inhalation : sans objet.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- L'utilisation de gants est recommandée

- Une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, conformément à la réglementation locale [L'emballage et les restes (consommés ou non) de rodenticides sont considérés comme des déchets dangereux. L'enlèvement et la destruction doivent être effectués par une entreprise spécialisée ou agréée].

- Dangereux pour la faune.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil.

- Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.

- Durée de conservation: 2 ans.

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

- En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.

- Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.

- Ce produit contient un agent amérissant et un colorant.

- Les mentions de danger et de conseils de prudence correctement traduites, sont les suivantes:

H360D: Peut nuire au fœtus.

H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

EUH208: Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one et 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique.

P201: Se procurer les instructions avant utilisation.

P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P280: Porter des gants de protection/une combinaison de protection/un écran facial

P308 + P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Obtenir un avis médical/une attention particulière.

P314: Consulter un médecin en cas de malaise.

P405: Garder sous clef.

P501: Éliminer le contenu conformément aux réglementations nationales.