

SUMMARY OF THE BIOCIDAL PRODUCT CHARACTERISTICS FOR A BIOCIDAL PRODUCT

Information administrative

Nom du produit

Pelgar Brodifacoum pellets

Détenteur de l'autorisation

Nom et adresse	Nom	PelGar International Ltd
	Adresse	Unit 13 Newman Lane Industrial Estate, Alton GU34 2QR HAMPSHIRE
Numéro d'autorisation	BE2014-0011	
Date d'expiration de l'autorisation	31 janvier 2017	

Fabricant du produit

Name of manufacturer	PelGar International Ltd
Address of manufacturer	Unit 13 Newman Lane Industrial Estate, Alton GU34 2QR HAMPSHIRE

Fabricant de la substance active

Substance active	Brodifacoum	
Nom	PelGar International Ltd	
Adresse	Unit 13 Newman Lane Industrial Estate, Alton GU34 2QR HAMPSHIRE	
Adresse de la site de production	Site 1	PelGar International Ltd, Prazska 54, 280 02 Kolin, Czech Republic +44 1420 80744

Composition du produit

Confidential

Forme sous laquelle le produit est présenté :

Prêt-à-l'emploi (RB)

Utilisation(s) autorisée(s)

Product Type	14
Si relevant, description détaillée de l'utilisation autorisée	Un appât en granules, prêt-à-l'emploi, contenant Brodifacoum (0,005% p /p) pour une utilisation en tant que rodenticide pour le contrôle des rats et des souris à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments pour la protection de la santé publique, les produits et les matériaux stockés.
Organismes cibles (si relevant avec stade de développement)	<i>Rattus Norvegicus</i> <i>Mus musculus</i> and <i>Mus domesticus</i>
Domaine d'utilisation	IV.1 A l'intérieur IV.2 A l'extérieur (uniquement autour des bâtiments)
Méthode d'application	VI.2. usage sous couverture VI.2.1 dans des stations d'appâtage VI.2.2 autre couvertures
Dose prescrite et fréquence d'utilisation	Rats : 10-60g d'appât dans des postes d'appâtage inviolables couverts ou des points d'appâtage couverts espacés de 10m (5m dans les zones de forte infestation) dans les zones où les rats sont actifs Souris : Sécuriser 10-20g d'appât dans des postes d'appâtage inviolables couverts ou des points d'appâtage couverts espacés de 5m (2m dans les zones de forte infestation) dans les zones où les souris sont actifs.
Catégorie d'utilisateur	non-professionnels professionnels
Spécifications d'emballage	

Type/description d'emballage	Matériel d'emballage	Conditionnement amateur	Conditionnement professionnel
Papier multi-couches avec barrière anti-humidité ou papier multi-couches avec sac interne en PE ou PP tissé avec ou sans sac interne en PE.	Emballage intérieur : N/A Emballage extérieur : papier, PP , PE	N/A	5, 10, 20 ou 25kg
15, 20, 25, 30, 50 ou 60g papier/PE ou AL/PE ou papier/Al/PE sachets pour professionnels et amateur et	Emballage intérieur : papier/PE ou AL/PE ou papier/Al/PE	250g ou 500g	1kg, 1.5kg, 2kg, 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 8kg, 10kg, 15kg ou 20kg

100g ou 200g papier/PE ou AL/PE ou paper/Al/PE sachets pour professionnels, dans seaux ou sac en PE/PP	Emballage extérieur : seau ou sac en PP/PE		
15, 20, 25, 30, 50 or 60g papier/PE ou AL/PE ou papier/Al/PE sachets pour professionnels et amateur et 100g ou 200g papier/PE ou AL/PE ou paper/Al/PE, dans du carton doublé both in PE lined carton.	Emballage intérieur : papier/PE ou AL/PE ou papier/Al/PE Emballage extérieur carton doublé		1kg, 1.5kg, 2kg, 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 8kg, 10kg, 15kg ou 20 kg
15, 20, 25, 30, 50 or 60g papier/PE ou AL/PE ou papier/Al/PE sachets pour professionnels et amateur et 100g ou 200g papier/PE ou AL/PE ou paper/Al/PE, sachets, dans carton	Emballage intérieur : papier/PE ou AL/PE ou papier/Al/PE Emballage extérieur carton	250g or 500g	1kg, 1.5kg, 2kg, 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 8kg or 10kg
Appât en vrac en sachets ou seaux (PE/PP)	Emballage intérieur : N/A Emballage extérieur sachets ou seaux en PE/PP	N/A	1kg, 1.5kg, 2kg, 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 8kg, 10kg, 15kg or 20kg
Appât en vrac en carton doublée (PE)	Emballage intérieur : N/A Emballage extérieur carton doublée (PE)		10 kg ou 20 kg
Appâts en vrac jusqu'à 20 g (rats et souris) et jusqu'à 60 g (rats eusement) emballés dans des plateaux munis d'un couvercle thermoscellé et emballés par multiples de 2/4/8/12/16/20/24/32 dans des emballages extérieurs en carton	Emballage intérieur : plateaux avec couvercle thermoscellé Emballage extérieur : carton	10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60 g	10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60 g
Appâts en vrac jusqu'à 20 g (rats et souris) et jusqu'à 60 g (rats eusement) emballés dans des plateaux munis d'un couvercle thermoscellé, emballés dans un poste d'appâtage PEHD ou PP inviolables mono ou multi-usage en multiples de 1,2 ou 4 dans un emballage blister, machon en carton, sac thermoscellé ou emballage	Emballage intérieur : plateaux munis d'un couvercle thermoscellé Emballage extérieur : poste d'appâtage PEHD ou PP inviolables dans un emballage blister, machon en carton, sac thermoscellé ou emballage extérieur poly thermoscellé avec	10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60 g	10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60 g

extérieur poly thermoscellé avec dessus carton.	dessus carton.		
--	----------------	--	--

Taille des appâts : 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60 g

Taille maximum des paguets pour les produits non professionnels : 500 g

Les produits d'appât vendus aux non-professionnels doivent être fournis sous forme de postes d'appâtage pré-appâtés ou de postes d'appâtage inviolables pré-appâtés et de recharges.

Les appâts de postes d'appâtages pré-appâtés doivent être fournis en quantité suffisante pour délivrer une dose létale aux rongeurs ciblés.

Les appâts des produits non professionnels de recharge doivent être fournis sous forme de paquets ou d'unités (p.ex. sachet/enveloppés), les paquets/unités internes devant contenir une quantité d'appât suffisante pour permettre une application efficace à un ou plusieurs endroits.

Caractéristiques de sécurité: stations d'appâtage couverts (inviolables) et appât emballé en sachets

Communication de danger et de prudence

Classification and labelling of the product according to Regulation (EC) 1272/2008	
Classification	
Catégorie de danger	n.a.
Mentions de danger	n.a.
Specific Concentration Limits	
Etiquetage	
Mots de signalement	n.a.
Mentions de danger	n.a.
Conseils de prudence	<p>P102: Tenir hors de portée des enfants. P103: Lire l'étiquette avant utilisation. P220: Tenir / stocker à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux P262: Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273: Eviter le rejet dans l'environnement. P280: Porter des gants de protection. (seulement pour professionnels) P301+310: EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P404+405: Stocker dans un récipient fermé, garder sous clef P501: Eliminer le contenu / récipient conforme à la réglementation locale</p>

Classification and labelling of the product according to Directive 1999/45/EC	
Catégorie de danger	n.a.
Phrases de risque	n.a.
Phrases de sécurité	<p>S1+S2: Conserver sous clé, hors de la portée des enfants S13: Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux S20 + S21: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation S24:Eviter le contact avec la peau S35: Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. S37: Porter des gants appropriés. (Professionnel seulement) S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S49: Conserver uniquement dans le récipient d'origine S61: Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.</p>

Etiquetage supplémentaire

Pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, respecter les instructions d'utilisation.

Nocif pour la faune

Utilisez des poste d'appâtage avec le mention visible «poison» sur tous les points d'appâtage de surface.

Éliminez tous les restes d'appâts, les rongeurs morts pendant et après le traitement et de disposer de façon sécuritaire. Appliquer seulement dans des endroits inaccessibles aux enfants et aux animaux domestiques.

Mode d'emploi

Instructions pour la manipulation et l'application en sécurité du produit:

- Toujours lire l'étiquette avant l'emploi et suivre les instructions fournies.
- Le produit doit être manipulé en toute sécurité.
- Eviter toute exposition inutile, en particulier éviter l'ingestion.
- Les appâts doivent être déposés dans des postes d'appâtage ou sous d'autres couvertures de manière à minimaliser le risque d'ingestion par les animaux domestiques, d'autres animaux non cibles et les enfants. Lorsque c'est possible, sécuriser les appâts afin qu'ils ne peuvent pas être emmenés.
- Les cadavres des rongeurs, les restants d'appâts non utilisés ou n'importe quel morceau d'appât retrouvé hors du poste d'appâtage doit être recueilli au cours de chaque opération de contrôle pour minimaliser le risque de consommation et d'empoisonnement des enfants, des animaux domestique et des autres animaux non cibles.
- Se laver les mains et le visage après l'application et l'usage du produit et avant de manger, de boire ou de fumer.
- Il est illégal d'utiliser ce produit pour l'empoisonnement intentionnel d'animaux non cibles, utiles et protégés.

Instructions spécifiques pour les Professionnels

- Une étude approfondie de la zone infestée est essentiel, en particulier dans des endroits désolés et abrités, afin de déterminer le degré de l'infestation.
- L'USAGE DANS LES LIEUX PUBLICS: Quand le produit est utilisé dans les lieux publics et des caisses d'appâts inviolables et scellées ne sont pas utilisées, les éléments suivants doivent être mis en oeuvre. Quand le produit est utilisé dans les lieux publics, les zones traitées doivent être marquées au cours de la période du traitement et un avis expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant, ainsi qu'indiquant les premières mesures à prendre en cas d'intoxication doivent être mis à la disposition à côté d'appâts. Si les caisses d'appât inviolables et scellées sont utilisées, elles doivent être clairement marquées pour montrer qu'elles contiennent des rodenticides et qu'elles ne devraient pas être perturbées.
- Se laver les mains et le visage après l'application et l'utilisation du produit et avant de manger, boire ou fumer.
- Pour les utilisateurs professionnels, l'utilisation d'un équipements de protection personnel approprié (PPE) est conseillé.

Mode d'emploi

A l'intérieur et à l'extérieur (autour des bâtiments)

Rats: Sécuriser 10-60g d'appât dans des postes d'appâtage inviolables couverts ou des points d'appâtage couverts espacés de 10m (5m dans les zones de forte infestation) dans les zones où les rats sont actifs. Vérifiez régulièrement la consommation d'appâts et remplacer l'appât consommé ou abimé jusqu'à la consommation s'est arrêtée. Répétez le traitement dans les situations où il existe des indications d'une nouvelle infestation (par exemple, des traces fraîches ou les excréments).

Souris: Sécuriser 10-20g d'appât dans des postes d'appâtage inviolables couverts ou des points d'appâtage couverts espacés de 5m (2m dans les zones de forte infestation) dans les zones où les souris sont actifs. Vérifiez régulièrement la consommation d'appâts et remplacer l'appât consommé ou abimé jusqu'à la consommation s'est arrêtée. Répétez le traitement dans les situations où il existe des indications d'une nouvelle infestation (par exemple, des traces fraîches ou les excréments).

Particularités de l'effet direct ou indirect susceptible d'être défavorable et instructions de premiers soins:

Particularités d'effets défavorables:

La substance active sous forme d'appâts peut être palatable pour des hommes et des espèces non cibles en quantité suffisante pour produire des effets toxiques.

Des effets résultent de l'inhibition de la coagulation du sang comme Brodifacoum interagit avec la vitamine K1. Les symptômes d'empoisonnement comprennent: des ecchymoses facilement, du nez ou de la gomme saigne, le sang dans les selles ou les urines, saignement excessif des coupes ou des abrasions mineures. Notez que les symptômes d'empoisonnement peuvent apparaître pendant plusieurs jours

PREMIERS SECOURS

Mention général:	En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'étiquette si possible)
Inhalation:	Pas d'application
Oral:	En cas d'ingestion ou en cas d'un avalement, consulter immédiatement un médecin.
Les yeux	En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de contact si présentes et rincer les yeux lentement et prudemment avec de l'eau pendant 15-20 minutes. Consulter immédiatement un médecin
Dermal :	L'usage des gants est conseillé pour la protection des mains.[Uniquement professionnels] En cas de contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau. Enlever et laver tout vêtement contaminé.

Remarques pour le médecin:

Antidote- Vitamin K1 –sous supervision médicale.

Information sur le poison

Le produit contient un agent aversif (benzoate de dénatonium) afin d'éviter l'ingestion.

Le produit contient un colorant pour éviter la consommation par organismes non-cibles, en particulier les oiseaux.

Instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage:

Ce produit et son récipient doivent être éliminés en toute sécurité.

Éliminer les emballages, les restants du produit non utilisés et les rongeurs morts en conformité avec les réglementations locales.

Si nécessaire, consultez un opérateur de déchets ou une autorité locale.

Conditions de stockage et durée de vie dans des conditions normales

Instructions pour le stockage

Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Garder enfermé dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé

La durée de vie du produit est considérée comme stable pendant deux ans à température ambiante. Utilisez avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Autre information

Informations sur la résistance

L'état de la résistance de la population de rongeurs pour Brodifacoum doit être pris en compte dans le choix du rodenticide à utiliser. Si la résistance pour Brodifacoum a été montrée ou est soupçonnée, les stratégies de gestion de résistance doivent être mises en oeuvre par les professionnels / professionnels formés. Pour les non-professionnels, en cas de doute ou si les mesures d'appâtage sont infructueuses, consulter un opérateur professionnel spécialisé dans la lutte antiparasitaire.

Informations additionnels:

Codes d'application:

I: Organismes cibles à lutter

I.1 *Rodentia* Rodents

I.1.1 *Muridae* Murids

I.1.1.1 *Rattus norvegicus* rat brun

I.1.1.3 *Mus musculus* and *Mus domesticus* souris

II: Stade de développement des organismes cibles

II.1 Juvéniles

II.2 Adultes

III: Fonction / mode d'action de s.a. / p.b.

III.2 action à longue terme

III.2.1 anticoagulant

III.2.1.1 ingestion de toxine

III.2.1.1.1 ingestion orale

IV: Utilisation

IV.I utilisation à l'intérieur

IV.1.1. Potentiel de contamination à l'extérieur

IV.1.1.1 oui

IV.1.2. Potentiel de contamination de la nourriture

IV.1.2.2. non

IV.2 utilisation à l'extérieur (seulement autour des bâtiments

V: Catégorie d'utilisateur

V.1 non-professionnel / grand public

V.2 professionnel

V.3 professionnel formé

VI: Méthode d'application

VI.2 Applications sous couverture

VI.2.1 dans des stations d'appâtage

VI.2.2 autres (seulement professionnel)

VII: But d'application

VII. I Protection du produit stocké

VII.2 Protection de la santé

VII.3 Protection des matériels

VIII: Type de formulation

VIII.4 autre formulation

VIII.4.1 appât (prêt-à-l'emploi)