

FR

ANNEXE

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

Mosquito Milk Roll On 50% DEET

Type(s) de produit

TP19: Répulsifs et appâts

Numéro d'autorisation: BE2015-0028

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: BE-0009025-0000

Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	Moustimug Tropical Maxx Roller
---------------------------------	--------------------------------

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Perrigo Supply Chain International DAC
	Adresse	The Sharp Building - Hogan Place D02 TY74 Dublin Irlande
Numéro de l'autorisation		BE2015-0028
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		BE-0009025-0000
Date de l'autorisation		01/08/2014
Date d'expiration de l'autorisation		31/01/2025

1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
Adresse du fabricant	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Allemagne

Nom du fabricant	Medgenix Benelux n.v.
Adresse du fabricant	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Vertellus Performance Materials Inc.
Adresse du fabricant	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis d'Amérique
Emplacement des sites de fabrication	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis d'Amérique

Substance active	N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Clariant Corporation
Adresse du fabricant	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Belgique
Emplacement des sites de fabrication	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly États-Unis d'Amérique

Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-mét a-toluamide	N,N-diethyl-m-to luamide	substance active	134-62-3	205-149-7	48,5 % (p/p)
Ethanol	Ethyl alcohol	Substance non active	64-17-5	200-578-6	38,31 % (p/p)

2.2. Type(s) de formulation

AL Autre liquide

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	<p>H225: Liquide et vapeurs très inflammables.</p> <p>H318: Provoque des lésions oculaires graves.</p> <p>EUH208: Contient du (de la) linalool, linalyl acetate, benzyl benzoate. Peut produire une réaction allergique.</p>
Conseils de prudence	<p>P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.</p> <p>P102: Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.</p> <p>P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.</p> <p>P305: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:</p> <p>P351: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.</p> <p>P338: Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P260: Ne pas respirer les vapeurs.</p>

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1. Description de l'utilisation

Tableau 1. Produit répulsif contre les moustiques chez l'homme

Type de produit	TP19: Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit répulsif contre les moustiques chez l'homme
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Culicidae: Culicidae: Nom commun: autre: Culex mosquito Stade de développement: adultes Nom scientifique: Culicidae: Culicidae: Nom commun: Anopheles mosquito Stade de développement: adultes Nom scientifique: Culicidae: Culicidae: Nom commun: Aedes mosquito Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur utilisation en extérieur En plein air ou dans un endroit bien aéré
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: Roll on Description détaillée: Utiliser ca. 1 ml par 600cm ² de la peau (correspond à 1 ml par bras mâle adulte). Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Utiliser environ 1 ml par 600 cm ² de peau Dilution (%): 100 Nombre et fréquence des applications: 1 fois par jour
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	50 mL bouteille verre ou HDPE Ouverture: 30 mm Fermeture PP; PE montage avec PP balle

4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Ce produit ne peut être utilisé pour repousser les moustiques pour protéger les gens.

Ce produit est destiné à un usage non-professionnel.

Ce produit fournit en moyenne 12 heures de protection contre les espèces de moustiques les plus courants en Belgique. Pour certaines espèces de moustiques tropicaux le temps de protection peut être beaucoup plus court: sur moyenne 7 heures contre le moustique de la fièvre jaune et de 10 heures contre le moustique vecteur du paludisme.

Des facteurs tels que la température, l'humidité et la transpiration peuvent affecter l'efficacité du produit.

Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection. Ne pas appliquer sur le visage.

Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée.

Eviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées.

Utilisez seulement en plein air ou dans un endroit bien aéré.

Ne pas utiliser plus d'une fois par jour.

Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 18 ans.

Se laver les mains après utilisation.

4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Utilisez seulement en plein air ou dans un endroit bien aéré

Ne pas utiliser plus d'une fois par jour

Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 18 ans

Se laver les mains après utilisation

Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection

4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri de l'humidité.

Conserver hors de la portée des enfants.

Bien fermer la bouteille.

Durée de conservation de 5 ans.

4.2. Description de l'utilisation

Tableau 2. Produit répulsif contre les tiques chez l'homme

Type de produit	TP19: Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit répulsif contre les tiques chez l'homme
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Ixodidae: Ixodidae: Nom commun: ticks Stade de développement: adultes Nom scientifique: Ixodidae: Ixodidae: Nom commun: ticks Stade de développement: nymphes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur utilisation en extérieur En plein air ou dans un endroit bien aéré
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: Roll on Description détaillée: Etendre délicatement et uniformément sur les parties non-couvertes du corps: tête, cou, mains (paumes et dessus), avant-bras, partie inférieures de la jambe, pieds et 70% des parties supérieures des bras et des cuisses. Cela correspond à une tenue normale pour l'extérieur (t-shirt à manches courtes).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 100 Dilution (%): 100 Nombre et fréquence des applications: Lorsque le produit doit être réappliqué, veuillez respecter le nombre maximum d'application par jour: Deux fois par jour pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans Une fois par jour pour les enfants de plus de 6 ans Ne pas appliquer chez les enfants de moins de 6 ans
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	50 mL bouteille verre ou HDP Ouverture: 30 mm Fermeture PP; PE montage avec PP balle

4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Ce produit ne peut être utilisé pour repousser les tiques pour protéger les gens.

Ce produit est destiné à un usage non-professionnel.

Ce produit fournit en moyenne 8.5 heures de protection contre les tiques

Des facteurs tels que la température, l'humidité et la transpiration peuvent affecter l'efficacité du produit.

Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection. Ne pas appliquer sur le visage.

Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée.

Eviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées.

Utilisez seulement en plein air ou dans un endroit bien aéré.

Utilisez les répulsifs en toute sécurité. Veuillez à lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas appliquer sur les coupures, blessures, la peau fraîchement rasée ou irritée. Uniquement pour usage externe.

N'utiliser pas sous les vêtements. N'appliquez pas sur les vêtements.

Se laver les mains après utilisation.

L'application de produits solaires ou de formulations cosmétiques peut altérer l'efficacité du répulsif.
altérer l'efficacité du répulsif.

4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

N'appliquer que sur les parties non-couvertes du corps. Ne pas appliquer sur tout le corps. Privilégiez toujours la protection mécanique (moustiquaire, vêtements longs, t-shirts à manches longues et pantalons). Ne pas utiliser en dessous des vêtements.

Se laver les mains avant de manipuler de la nourriture. Ne pas appliquer directement ou à proximité de nourriture ou de boisson, ou sur des surfaces ou des ustensiles susceptibles d'être en contact directe avec de la nourriture ou des boissons. Pour éviter la contamination, éviter le contact de la peau traitée avec la nourriture.

Un adulte doit appliquer le produit sur les enfants de moins de 12 ans.

4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri de l'humidité.

Conserver hors de la portée des enfants.

Bien fermer la bouteille.

Durée de conservation de 5 ans.

Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION¹

5.1. Consignes d'utilisation

Voir mesure de mitigation spécifique à l'utilisation

5.2. Mesures de gestion des risques

Voir mesure de mitigation spécifique à l'utilisation

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir: instruction spécifiques d'utilisation, détails des effets directs ou indirects probables, premiers secours
Instructions et mesures immédiates pour protéger l'environnement

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Voir: instruction spécifique d'utilisation, instructions pour une élimination sûre du produit et de son emballage

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir : instructions spécifique d'utilisaton, conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

¹Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS