

FR

ANNEXE

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

Maxforce Quantum

Type(s) de produit

TP18: Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

Numéro d'autorisation: BE2018-0009

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: BE-0010655-0000

Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	Maxforce Quantum
---------------------------------	------------------

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Adresse	1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON France
Numéro de l'autorisation		BE2018-0009
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		BE-0010655-0000
Date de l'autorisation		03/10/2017
Date d'expiration de l'autorisation		16/05/2034

1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
Adresse du fabricant	1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON France
Emplacement des sites de fabrication	Bayer S.A.S/ Environmental Science site 1 ZI Nord 02250 Marle sur Serre France Rallis India Limited PLOT NO C-44, CHEMICAL ZONE, GIDC, DAHEJ, TAL. VAGRA, DIST. BHARUCH 392130 GUJARAT Inde Pharmcle Co., Ltd 84-45, Ucheonsanneopdanji-ro, Ucheon-myeon, Hoengseong-gun - Gangwon-do Corée (la République de) 2022 ES Discovery India Private Limited / Saraswati Agro Chemicals Pvt. Ltd. Saraswati Agro Chemicals (India) Pvt. Ltd. Lane No. 2, Phase 1, SIDCO Industrial Complex District Samba, Jammu, Jammu & Kashmir 181133 Bari Brahmana Inde

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	imidacloprid
Nom du fabricant	Bayer AG
Adresse du fabricant	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Bayer AG site 1 Chempark D-41538 Dormagen Allemagne

Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	substance active	138261-41-3	428-040-8	0,03 % (p/p)

2.2. Type(s) de formulation

RB Appât (prêt à l'emploi)

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence	P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P391: Recueillir le produit répandu. P501: Éliminer le contenu dans la législation nationale. P501: Éliminer le contenant dans la législation nationale.

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1. Description de l'utilisation

Tableau 1.
Usage professionnel

Type de produit	TP18: Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Insecticide
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: Hymenoptera: Formicidae: Nom commun: autre: Lasius niger (Fourmi noire des jardins) Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en extérieur Seulement pour les terrasses, les trottoirs, les patios, les entrées aux hangars et aux garages, les insitutions publiques (p. ex., hôpitaux, maisons de soins infirmiers)
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Pour usage extérieur seulement. Uniquement pour les nids situés sur des sols pavés. Le produit est appliqué directement à l'entrée du nid si le nid est situé sur un sol pavé (ex. un sol en pavés).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Injecter directement 2 g de produit dans l'entrée du nid Dilution (%): - Nombre et fréquence des applications: Réappliquer si l'appât est consommé. Maximum de 11 applications par an.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Cartouche/seringue en plastique (cartouche en PP avec embout et piston en PE), Ø25,7 * 118 mm 20 – 30 g

4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

L'application extérieure de gel en gouttes ne doit être effectuée que sur des surfaces pavées (ne pas appliquer sur un sol nu).

Placer le produit inaccessible aux animaux non ciblés. Appliquer ce produit biocide directement sur les nids de fourmis. Protégez le produit des abeilles et des intempéries en le recouvrant, par exemple avec un pot de fleurs

ou une tuile, en veillant à ce que les fourmis puissent toujours avoir accès à l'appât. Lorsqu'il est utilisé autour des bâtiments, ne pas appliquer près des drains. Si la zone traitée est reliée à la collecte des eaux de pluie ou à

l'égout, l'utiliser uniquement dans les zones qui ne sont pas susceptibles d'être submergées ou mouillées, c.-à-d. à l'abri de la pluie, des inondations et de l'eau de nettoyage.

4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les conditions générales de l'utilisation.

4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les conditions générales de l'utilisation.

4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales de l'utilisation.

4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales de l'utilisation.

4.2. Description de l'utilisation

Tableau 2.
Professionnel indoor

Type de produit	TP18: Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Insecticide
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Hymenoptera: Formicidae: Hymenoptera: Formicidae: Nom commun: autre: Tapinoma melanocephalum (Fourmi fantôme) Stade de développement: adultes Nom scientifique: Hymenoptera: Formicidae: Hymenoptera: Formicidae: Nom commun: autre: Monomorium pharaonis (Fourmi pharaon) Stade de développement: adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Locaux industriels/commerciaux, ménages/espaces privés, cuisines, salons et caves, institutions publiques (p. ex., hôpitaux, maisons de retraite)
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Le produit est appliqué le long des chemins des fourmis.

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 1 goutte de 200 mg/m ² ou 1 goutte de 200 mg/m de chemin de fourmis (1 goutte de 1 cm de diamètre = 200 mg). Dilution (%): - Nombre et fréquence des applications: Réappliquer si l'appât est consommé. Maximum de 11 applications par an.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Cartouche/seringue en plastique (cartouche en PP avec embout et piston en PE), Ø25,7 * 118 mm (20 – 30 g)

4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Voir les conditions générales de l'utilisation.

4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Voir les conditions générales de l'utilisation.

4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les conditions générales de l'utilisation.

4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions générales de l'utilisation.

4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions générales de l'utilisation.

Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION¹

5.1. Consignes d'utilisation

Le produit est distribué à l'aide d'un applicateur de gel approprié. Une fois le traitement terminé, retirez la cartouche vide et jetez-la en toute sécurité. Si la cartouche n'est utilisée que partiellement, retirez-la de l'applicateur, scellez-la avec le capuchon fourni et rangez-la comme indiqué.

Lisez toujours l'étiquette ou la notice avant utilisation et suivez toutes les instructions fournies.

Utiliser les produits aux doses et intervalles recommandés.

Avant le traitement, retirez toutes les sources naturelles de nourriture pour les fourmis (déchets, restes de nourriture ...) de la zone infestée pour encourager l'ingestion du gel.

L'utilisation de produits biocides peut être combinée avec d'autres mesures d'assainissement.

Ne pas appliquer le produit sur des surfaces absorbantes.

Appliquez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil ou des sources de chaleur (par ex. ne le placez pas sous un radiateur).

Vérifiez les points d'appât une fois par semaine. Lors des inspections, vérifiez la zone traitée et, si nécessaire, appliquez une nouvelle dose de gel.

Une réduction notable des fourmis est attendue dans les 4 semaines. L'efficacité n'est prouvée que contre les travailleurs adultes, et non contre l'ensemble du nid.

Surveiller les populations de ravageurs difficiles à contrôler afin de détecter les premières réductions de sensibilité à la substance active de ce produit biocide. Informer le titulaire de l'autorisation si le traitement est

inefficace.

Afin d'éviter l'apparition d'une résistance à tout principe actif, les produits ayant différents modes d'action doivent être utilisés en alternance et l'utilisation répétée fréquente de la même substance active doit être évitée.

Ne pas utiliser de produits contenant des néonicotinoïdes (c.-à-d. acétamipride, clothianidine, dinotéfurane, imidaclopride, thiaméthoxame) comme substance active(s) pour le traitement de suivi lorsque la résistance

réduit l'efficacité.

Évitez l'utilisation continue des produits.

Si l'infestation n'est pas contrôlée, une nouvelle application peut être nécessaire.

5.2. Mesures de gestion des risques

Ne pas utiliser directement sur ou à proximité d'aliments, d'aliments, d'eau potable ou de boissons, ou sur des surfaces ou des ustensiles susceptibles d'être en contact direct avec des aliments, des aliments, de l'eau potable ou des boissons et du bétail/animaux de compagnie.

Placer le produit ou l'appât hors de la portée des enfants, des oiseaux, des animaux de compagnie, des animaux de ferme et d'autres animaux non ciblés.

Garder hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non ciblés.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

EN CAS D'INGESTION : En cas de symptômes, appelez un CENTRE ANTIPOISON (tél.: 070 245 245) ou un médecin.

SI VOUS ÊTES SUR LA PEAU : Lavez la peau avec de l'eau. Si les symptômes se manifestent, appelez un CENTRE ANTIPOISON (tél.: 070 245 245) ou un médecin.

DANS LES YEUX : Si les symptômes se manifestent, rincer à l'eau. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire. Appeler un CENTRE ANTIPOISON (tél.: 070 245 245) ou un médecin.

INHALATION non applicable.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne pas contaminer les cours d'eau ou les cours d'eau avec le produit ou les contenants usagés.

¹Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

Code européen des déchets - 200119: pesticides (FDS uniquement)

Code européen des déchets - 150110: Emballages contenant des résidus ou contaminés par des substances dangereuses (FDS uniquement)

Ne rejetez pas de produit inutilisé sur le sol, dans les cours d'eau, dans les tuyaux (évier, toilettes...) ni dans les drains.

Éliminer le produit inutilisé, son emballage et tous les autres déchets, conformément à la législation nationale en vigueur (centre de recyclage).

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Ne pas entreposer à proximité de la nourriture, des boissons et des aliments.

Conserver dans le contenant d'origine.

Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Protéger du gel.

Ranger loin de la lumière.

Durée de conservation jusqu'à 36 mois.

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

Ce produit contient de l'imidaclopride qui est dangereux pour les abeilles.
Le produit contient un agent amérisant.