

DE

ANHANG

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS

DEGESCH PLATE

Produktart(en)

PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Zulassungsnummer: BE2025-0004

R4BP-Assetnummer: BE-0033235-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	DEGESCH PLATE DEGESCH STRIP
----------------	--------------------------------

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Detia Freyberg GmbH
	Anschrift	Dr.-Werner-Freyberg-Str.11 69514 Laudenbach Deutschland
Zulassungsnummer		BE2025-0004
<i>R4BP-Assetnummer</i>		BE-0033235-0000
Datum der Zulassung		06/04/2025
Ablauf der Zulassung		26/10/2033

1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	Detia Freyberg Produktion GmbH
Anschrift des Herstellers	Dr.-Werner-Freberg-Str. 11 69514 Laudenbach Deuts chland
Standort der Produktionsstätten	Detia Freyberg Produktion GmbH site 1 Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 69514 Laudenbach Deutschland

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	Phosphin freisetzendes Magnesiumphosphid
Name des Herstellers	Degesch de Chile Ltda.
Anschrift des Herstellers	José Luis Caro (former street name: Camino Antiguo a Valparaiso) 1321 n.a. Padre Hurtado – Talagante, San tiago Chile
Standort der Produktionsstätten	Degesch de Chile Ltda. site 1 José Luis Caro (former street name: Camino Antiguo a Valparaiso) 1321 n.a. Padre Hurtado – Talagante, Santiago Chile

Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Phosphin freisetzendes Magnesiumdiphosphid	Trimagnesiumdiphosphid	Wirkstoff	12057-74-8	235-023-7	72,43 % (w/w)

2.2. Art(en) der Formulierung

GE Gaserzeugendes Produkt

Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	<p>H260: In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.</p> <p>H300: Lebensgefahr bei Verschlucken.</p> <p>H310: Lebensgefahr bei Hautkontakt.</p> <p>H319: Verursacht schwere Augenreizung.</p> <p>H330: Lebensgefahr bei Einatmen.</p> <p>H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.</p> <p>EUH029: Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.</p> <p>EUH032: Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.</p> <p>EUH070: Giftig bei Berührung mit den Augen.</p> <p>EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanweisung einhalten.</p>
Sicherheitshinweise	<p>P260: Gas nicht einatmen.</p> <p>P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.</p> <p>P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.</p> <p>P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.</p> <p>P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.</p> <p>P284: [Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.</p> <p>P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.</p> <p>P330: Mund ausspülen.</p> <p>P302: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:</p> <p>P335: Lose Partikel von der Haut abbürsten.</p> <p>P352: Mit viel Wasser waschen.</p> <p>P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.</p> <p>P304 + P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.</p> <p>P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.</p>

P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P320: Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe Erste-Hilfe Maßnahmen auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P361: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

P370 + P378: Bei Brand: CO₂, Sand oder Löschpulver zum Löschen verwenden.

P402 + P404: An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

P403 + P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

P405: Unter Verschluss aufbewahren.

P501: Inhalt gemäß den lokalen/regionalen (national/international) Bestimmungen zuführen.

P501: Behälter gemäß den lokalen/regionalen (national/international) Bestimmungen zuführen.

P223: Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.

P234: Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1.
Lagerung an Land

Produktart	PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	<p>Wissenschaftlicher Name: <i>Anobium punctatum</i> Trivialname: Gemeiner Nagekäfer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Lasioderma serricorne</i> (F.) Trivialname: Tabakkäfer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Stegobium paniceum</i> (L.) Trivialname: Brotkäfer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Araecerus fasciculatus</i> Trivialname: Kaffeebohnenkäfer,- rüssler Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Dinoderus minutus</i> Trivialname: Bohrkäfer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Prostephanus truncatus</i> (Horn) Trivialname: Großer Kornbohrer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Rhyzoperta dominica</i> (F.) Trivialname: Getreidekapuziner Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) Trivialname: Bohnenkäfer, Speisebohnenkäfer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Callosobruchus chinensis</i> (L.) Trivialname: Chinesischer Bohnen- oder Kundekäfer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Caryedon serratus</i> (Oliv.) Trivialname: Westafrikan. Erdnussamenkäfer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Chalcophora mariana</i> Trivialname: Marienprachtkäfer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Trivialname: Hausbock</p>

Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte
 Wissenschaftlicher Name: *Necrobia rufipes* (Deg.)
 Trivialname: Kobrakäfer, rotbeiniger Kolben – oder Schinkenkäfer
 Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte
 Wissenschaftlicher Name: *Cryptolestes ferrugineus* (Steph.)
 Trivialname: Rotbrauner Leistenkopflattkäfer
 Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte
 Wissenschaftlicher Name: *Cossonus linearis*
 Trivialname: Gemeiner Faulholzrüssler
 Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte
 Wissenschaftlicher Name: *Sitophilus granarius* (L.)
 Trivialname: Kornkäfer
 Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte
 Wissenschaftlicher Name: *Sitophilus oryzae* (L.)
 Trivialname: Reiskäfer
 Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte
 Wissenschaftlicher Name: *Sitophilus zeamais* (Motsch)
 Trivialname: Maiskäfer
 Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte
 Wissenschaftlicher Name: *Anthrenus museorum* (L.)
 Trivialname: Kabinettkäfer
 Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte
 Wissenschaftlicher Name: *Anthrenus verbasci*
 Trivialname: Wollkrautblütenkäfer
 Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte
 Wissenschaftlicher Name: *Attagenus pellio* (L.)
 Trivialname: Gefleckte Pelzkäfer
 Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte
 Wissenschaftlicher Name: *Dermestes lardarius* (L.)
 Trivialname: Gemeiner Speckkäfer
 Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte
 Wissenschaftlicher Name: *Dermestes haemorrhoidalis*
 Trivialname: Zweifarbig Behaarter Speckkäfer
 Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte
 Wissenschaftlicher Name: *Trogoderma granarium* (Everts)
 Trivialname: Khaprakäfer
 Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte
 Wissenschaftlicher Name: *Lyctus brunneus*
 Trivialname: Brauner Splintholzkäfer
 Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte
 Wissenschaftlicher Name: *Calopus serraticornes*
 Trivialname: Balkenbohrer
 Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte
 Wissenschaftlicher Name: *Tenebroides mauritanicus* (L.)

Trivialname: Schwarzer Getreidenager
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Niptus hololeucus* (Fld.)
Trivialname: Messingkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Ptinus fur* (L.)
Trivialname: Gemeiner Diebkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Ptinus tectus* (Boield.)
Trivialname: Australischer Diebkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Xyloterus signatus*
Trivialname: Eichennutzholzborkenkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Oryzaephilus surinamensis* (L.)
Trivialname: Getreideschmalkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Gnathocerus cornutus* (F.)
Trivialname: Vierhornkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Tenebrio molitor* (L.)
Trivialname: Mehlkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Tribolium castaneum* (Herbst)
Trivialname: Rotbrauner Reismehlkäfer o. gemeiner Dreispitzkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Tribolium confusum* (J. du V)
Trivialname: Amerikanischer Reismehlkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Sitotroga cerealella* (Oliv.)
Trivialname: Getreidemotte
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Ephestia kuehniella* (Zell.)
Trivialname: Mehlmotte
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Ephestia (Cadra) cautella* (Wlk.)
Trivialname: Dattel-, Mandel-, trop. Speichermotte
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Ephestia elutella* (Hübner.)
Trivialname: Speichermotte
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Corcyra cephalonica* (Saint.)
Trivialname: Reismotte
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

	<p>Wissenschaftlicher Name: <i>Plodia interpunctella</i> (Hüb.) Trivialname: Dörrobstmotte Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Nemapogon granella</i> (L.) Trivialname: Kornmotte Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Tineola bisselliella</i> Trivialname: Kleidermotte Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Kaloterme</i> sp. Trivialname: Termiten Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Sirex juvencus</i> Trivialname: Gemeine Holzwespe Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p>
Anwendungsbereich(e)	<p>Innenverwendung</p> <p>Innenraum: Silos, Flachlager, Sackstapel, Lagerräume, Container, andere gasdichte Gebäude (verschlossen/ versiegelt; leer oder mit Lagergütern):</p> <p>Futtermittel pflanzlichen und tierischen Ursprungs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Getreideverarbeitungserzeugnisse (inklusive gewalzter Fraktionen und abgepackte Getreideerzeugnisse) • Backmischungen • Verarbeitete Getreidelebensmittel (wie Nudelprodukte, Snacks, Kekse etc.) • Verarbeitetes Gemüse (Kartoffelprodukte) • Gepökelte/geräucherte, getrocknete und verarbeitete Fleisch- und Fischprodukte, Milcherzeugnisse (wie Milchpulver, Käse und Nebenerzeugnisse etc.) • Verarbeiteter Kaffee • Verarbeitete Aromate • Schokolade und Schokoladenprodukte • Verarbeitete Süßigkeiten und Zucker • Verarbeitete Nüsse <p>Nichtnahrungsmittel aus den folgenden Kategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verarbeiteter Tabak und Tabakprodukte • Verarbeitete Naturfasern • Federn • Holz, Holzhackschnitzel, Möbel, Bambus, Rattan und deren Produkte • Papier und Papierprodukte • Verpackungsmaterial: Kartons, Papier- und Jutebeutel, hölzerne Boxen, etc. • Leder, Lederprodukte, Tierhäute und Pelze
Anwendungsmethode(n)	<p>Methode: Begasung</p> <p>Detaillierte Beschreibung: -</p>
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	<p>Aufwandmenge: 1 Plate mit je 117 g/6 m³ entspricht 33 g PH₃/6 m³ bei einer Einwirkzeit von 60 Stunden. 1 Strip mit je 2340 g/120 m³ entspricht 660 g PH₃/120 m³ bei einer Einwirkzeit von 60 Stunden. -</p>

	<p>Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:</p> <p>1 Plate mit je 117 g/6 m³ entspricht 33 g PH3/6 m³ bei einer Einwirkzeit von 60 Stunden. 1 Strip mit je 2340 g/120 m³ entspricht 660 g PH3/120 m³ bei einer Einwirkzeit von 60 Stunden.</p>
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	<p>Plates oder Strips in verschweißten, gasdichten Aluminiumverbundfolienbeuteln (die geschichtete Struktur der Beutel ist definiert als PET/AL/PE und die Beutel befinden sich in einer Metalldose (UN-1A2/X40/S/*, B/MF-070103)) in den folgenden Verpackungseinheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Plate mit je 117 g im Aluminiumverbundfolienbeutel • 1 Strip (= 20 Plates) mit je 2340 g im Aluminiumverbundfolienbeutel

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung.

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung.

4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung.

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung.

4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung.

4.2. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 2.
Lagerung in Schiffen

Produktart	PT18: Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	<p>Wissenschaftlicher Name: <i>Anobium punctatum</i> Trivialname: Gemeiner Nagekäfer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Lasioderma serricorne</i> (F.) Trivialname: Tabakkäfer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Stegobium paniceum</i> (L.) Trivialname: Brotkäfer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Araecerus fasciculatus</i> Trivialname: Kaffeebohnenkäfer,- rüssler Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Dinoderus minutus</i> Trivialname: Bohrkäfer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Prostephanus truncatus</i> (Horn) Trivialname: Großer Kornbohrer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Rhyzoperta dominica</i> (F.) Trivialname: Getreidekapuziner Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) Trivialname: Bohnenkäfer, Speisebohnenkäfer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Callosobruchus chinensis</i> (L.) Trivialname: Chinesischer Bohnen- oder Kundekäfer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Caryedon serratus</i> (Oliv.) Trivialname: Westafrikan. Erdnussamenkäfer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Chalcophora mariana</i> Trivialname: Marienprachtkäfer Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Trivialname: Hausbock Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p>

Wissenschaftlicher Name: *Necrobia rufipes* (Deg.)
Trivialname: Kobrakäfer, rotbeiniger Kolben – oder Schinkenkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Cryptolestes ferrugineus* (Steph.)
Trivialname: Rotbrauner Leistenkopflattkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Cossonus linearis*
Trivialname: Gemeiner Faulholzrüssler
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Sitophilus granarius* (L.)
Trivialname: Kornkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Sitophilus oryzae* (L.)
Trivialname: Reiskäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Sitophilus zeamais* (Motsch)
Trivialname: Maiskäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Anthrenus museorum* (L.)
Trivialname: Kabinettkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Anthrenus verbasci*
Trivialname: Wollkrautblütenkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Attagenus pellio* (L.)
Trivialname: Gefleckte Pelzkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Dermestes lardarius* (L.)
Trivialname: Gemeiner Speckkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Dermestes haemorrhoidalis*
Trivialname: Zweifarbig Behaarter Speckkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Trogoderma granarium* (Everts)
Trivialname: Khaprakäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Lyctus brunneus*
Trivialname: Brauner Splintholzkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Calopus serraticornes*
Trivialname: Balkenbohrer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Tenebroides mauritanicus* (L.)
Trivialname: Schwarzer Getreidenager
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Niptus hololeucus* (Fld.)
Trivialname: Messingkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Ptinus fur* (L.)
Trivialname: Gemeiner Diebkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Ptinus tectus* (Boield.)
Trivialname: Australischer Diebkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Xyloterus signatue*
Trivialname: Eichennutzholzborkenkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Oryzaephilus surinamensis* (L.)
Trivialname: Getreideschmalkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Gnathocerus cornutus* (F.)
Trivialname: Vierhornkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Tenebrio molitor* (L.)
Trivialname: Mehlkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Tribolium castaneum* (Herbst)
Trivialname: Rotbrauner Reismehlkäfer o. gemeiner Dreispitzkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Tribolium confusum* (J. du V)
Trivialname: Amerikanischer Reismehlkäfer
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Sitotroga cerealella* (Oliv.)
Trivialname: Getreidemotte
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Ephestia kuehniella* (Zell.)
Trivialname: Mehlmotte
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Ephestia (Cadra) cautella* (Wlk.)
Trivialname: Dattel-, Mandel-, trop. Speichermotte
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Ephestia elutella* (Hüb.)
Trivialname: Speichermotte
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Corcyra cephalonica* (Saint.)
Trivialname: Reismotte
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

Wissenschaftlicher Name: *Plodia interpunctella* (Hüb.)
Trivialname: Dörrobstmotte
Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte

	<p>Wissenschaftlicher Name: Nemapogon granella (L.) Trivialname: Kornmotte Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: Tineola bisselliella Trivialname: Kleidermotte Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: Kaloterme sp. Trivialname: Termiten Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p> <p>Wissenschaftlicher Name: Sirex juvencus Trivialname: Gemeine Holzwespe Entwicklungsstadium: Eier, Larven, Nymphen, Puppen, Adulte</p>
Anwendungsbereich(e)	<p>Innenverwendung</p> <p>Innenraum: Frachträume von Schiffen (Begasung und Belüftung nur an Anlegestellen im Hafen erlaubt) (verschlossen/ versiegelt; leer oder mit Lagergütern): Futtermittel pflanzlichen und tierischen Ursprungs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Getreideverarbeitungserzeugnisse (inklusive gewalzter Fraktionen und abgepackte Getreideerzeugnisse) • Backmischungen • Verarbeitete Getreidelebensmittel (wie Nudelprodukte, Snacks, Kekse etc.) • Verarbeitetes Gemüse (Kartoffelprodukte) • Gepökelte/geräucherte, getrocknete und verarbeitete Fleisch- und Fischprodukte, Milcherzeugnisse (wie Milchpulver, Käse und Nebenerzeugnisse etc.) • Verarbeiteter Kaffee • Verarbeitete Aromate • Schokolade und Schokoladenprodukte • Verarbeitete Süßigkeiten und Zucker • Verarbeitete Nüsse <p>Nichtnahrungsmittel aus den folgenden Kategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verarbeiteter Tabak und Tabakprodukte • Verarbeitete Naturfasern • Federn • Holz, Holzhackschnitzel, Möbel, Bambus, Rattan und deren Produkte • Papier und Papierprodukte • Verpackungsmaterial: Kartons, Papier- und Jutebeutel, hölzerne Boxen, etc. • Leder, Lederprodukte, Tierhäute und Pelze
Anwendungsmethode(n)	<p>Methode: Begasung</p> <p>Detaillierte Beschreibung: -</p>
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	<p>Aufwandmenge: 1 Plate mit je 117 g/6 m³ entspricht 33 g PH3/6 m³ bei einer Einwirkzeit von 60 Stunden. 1 Strip mit je 2340 g/120 m³ entspricht 660 g PH3/120 m³ bei einer Einwirkzeit von 60 Stunden. -</p> <p>Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:</p>

	<p>1 Plate mit je 117 g/6 m³ entspricht 33 g PH₃/6 m³ bei einer Einwirkzeit von 60 Stunden.</p> <p>1 Strip mit je 2340 g/120 m³ entspricht 660 g PH₃/120 m³ bei einer Einwirkzeit von 60 Stunden.</p>
Anwenderkategorie(n)	Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	<p>Plates oder Strips in verschweißten, gasdichten Aluminiumverbundfolienbeuteln (die geschichtete Struktur der Beutel ist definiert als PET/AL/PE und die Beutel befinden sich in einer Metalldose (UN-1A2/X40/S/*, B/MF-070103)) in den folgenden Verpackungseinheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Plate mit je 117 g im Aluminiumverbundfolienbeutel • 1 Strip (= 20 Plates) mit je 2340 g im Aluminiumverbundfolienbeutel

4.2.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

1. Die Begasung auf Schiffen wie z.B. Schuten, Binnen- und Küstenmotorschiffen ist nur in Häfen an der Anlegestelle durchzuführen. Übermäßige Feuchtigkeit und Ansammlungen von Nässe sind zu vermeiden und zu verhindern. Der gekennzeichnete Gefahrenbereich ist zu evakuieren. Bis zur Freigabe durch den Begasungsleiter darf das Schiff die Anlegestelle nicht verlassen und nur von sachkundigen, ausreichend geschützten Personen betreten werden.
2. Unter Deck dürfen unter Gas stehende Transportbehälter nur transportiert werden, wenn die Laderäume mit einer technischen Belüftung ausgestattet sind, deren Leistung mindestens zwei Luftwechsel pro Stunde betragen soll, bezogen auf den leeren Raum.

4.2.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung.

4.2.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung.

4.2.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung.

4.2.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe allgemeine Anweisungen für die Verwendung.

Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG¹

5.1. Gebrauchsanweisung

1. Verwendung nur durch berufsmäßige Verwender mit nachweisbar fortgeschrittener Kompetenz.
2. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

1. Alle Anwender müssen bei Aktivitäten innerhalb der behandelten Bereiche Atemschutzgeräte mit geeigneten Gasfiltern mit sich führen. Die Phosphin-Belastung muss während folgender Arbeiten durch geeignete Schutzmaßnahmen reduziert werden:

- Öffnen der Verpackung und Ausbringung,
- Öffnen von Containertüren und/oder Luken zur Belüftung,
- Abziehen der Plane nach Begasung von Lagerstapeln, -gütern usw.,
- Entsorgen von restlichem Magnesiumphosphid.

Falls technische und/oder organisatorische Maßnahmen nicht möglich sind, muss während der genannten Arbeiten ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. Der Zulassungsinhaber hat geeignete Masken und Filtertypen nach Art und Höhe der Schadstoffe unter Berücksichtigung von EN 529 vorzugeben, mindestens jedoch eine Vollmaske mit Gasfilter B2 (APF 20)

2. Die Verwendung eines persönlichen Gasetektors ist während des Umgangs mit dem Produkt (einschließlich Entfernung, Entsorgung und Wiedereintritt) vorgeschrieben. Bei einer Phosphinkonzentration von mehr als 0,1 ppm oder unter ungünstigen Bedingungen ist eine Atemschutzausrüstung (RPE) zu tragen. Der Wiedereintritt ohne RPE darf erst erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass die Phosphinkonzentration unter 0,1 ppm liegt.

3. Bei der Handhabung des Produkts ist das Tragen von Augenschutz verpflichtend.

4. Nicht bei Temperaturen unter 10 °C begasen.

5. Keine Anwendung in Wasserschutzzonen. Ein Sicherheitsabstand zu Oberflächen-gewässern von mindestens 10 m muss eingehalten werden (hiervon ausgenommen ist die Begasung von Frachträumen von Schiffen).

6. An feuchter Luft, bei Kontakt mit Wasser oder bei Einwirkung von Feuchtigkeit entwickelt sich Phosphin. Dieses Gas hat einen fischigen/knoblauchartigen Geruch, ist hochentzündlich und für Menschen und Tiere sehr giftig und ätzend.

7. Nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

8. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.

9. Vor der Durchführung der Begasung ist zu kontrollieren und sicherzustellen, dass sich keine Tiere (wie z.B. Vögel, Katzen, Fledermäuse, Nutztiere) in den zu begasenden Räumen/Gebäuden/Objekten/Bereichen aufhalten.

10. In Lagerbereichen mit hohem Volumen ist die ausreichende Wirksamkeit stark von der Verteilung des Begasungsmittels abhängig. Gute Durchdringungseigenschaften des Gases ermöglichen eine wirksame Gaskonzentration in allen Bereichen.

11. Die Durchlässigkeit des Verpackungsmaterials der Lagergüter muss in jedem Fall vor der Begasung getestet werden. Nur wenn der Grad der Durchlässigkeit bekannt ist und eine ausreichende Gasdurchdringung der Lagergüter sichergestellt ist, kann die Begasung durchgeführt werden.

12. Der Einsatz eines Spürgases zur Prüfung der Wirksamkeit der Raumabdichtung wird empfohlen.

13. Um ein zu begasendes Objekt ist ein Gefahrenbereich einzurichten und durch geeignete Absperrung zu sichern. Außerhalb des festgelegten Gefahrenbereiches darf das Begasungsmittel während der Einwirkzeit mit den bei Begasungen üblichen Gasmessmethoden (Prüfröhrchen, Messsysteme auf elektrochemischer Basis oder Photoionisationsdetektoren (PID)) mit einem Detektionslimit ≤ 0.01 ppm Phosphin nicht nachweisbar sein. Erforderlichenfalls ist der Gefahrenbereich entsprechend zu erweitern.

14. Die behandelten Räume/Objekte und der Gefahrenbereich sind mit Warnhinweisen zu kennzeichnen, welche die folgenden Elemente beinhalten:

- Symbol: Totenkopf mit gekreuzten Knochen;
- Text: Gefahr durch Begasung, Zutritt verboten;
- Name des Biozidprodukts;

¹Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

-
- Datum und Zeit der Begasung;
 - Adresse und Telefonnummer des Zulassungsinhabers oder der zuständigen Firma, welche die Begasung durchführt;
 - Notrufnummer

15. Die Phosphin-Konzentration in der Luft im begasten Objekt sowie in der Umgebung des begasten Objektes muss während der Begasung überwacht werden. Geeignete Messmethoden zur Bestimmung der Phosphin-Konzentration in der Luft sollten immer zur Verfügung stehen und zur Überprüfung der Konzentration genutzt werden. Das Aufstellen von direktanzeigenden Gasmessgeräten wird empfohlen. Die Verwendung eines kontinuierlich messenden Alarmsystems wird empfohlen. Die Messergebnisse und gegebenenfalls ergriffene Maßnahmen sind aufzuzeichnen und mit der Dokumentation über die Begasung aufzubewahren.

16. Der Anwender oder eine für Messungen des eingesetzten Begasungsmittels hinreichend fachkundige Person hat bis zur Freigabe der Fläche regelmäßig durch Kontrollmessungen der Konzentrationen des Begasungsmittels in der Umgebungsluft sicherzustellen, dass außerhalb des festgelegten Gefahrenbereichs keine Konzentrationen des Begasungsmittels oberhalb der Nachweisgrenze (≥ 0.01 ppm) auftreten.

17. Bei Anwendung in Räumen/Lagern nach dem Start der Begasung diese sofort verlassen und ausreichend gasdicht verschließen. Alle Räume müssen bis zur Freigabe verschlossen bleiben, so dass diese nicht betreten werden können. Sollten die vorhandenen Schließsysteme keinen ausreichenden Schutz bieten, so muss der Zugang durch den Austausch der Verschlüsse oder den Einbau zusätzlicher Sicherungsvorrichtungen verhindert werden. Bei Anwendung unter gasdichten Planen das zu behandelnde Gut gasdicht mit diesen Planen abdecken und nach dem Start der Begasung den Gefahrenbereich sofort verlassen.

18. Die Belüftung nach der Begasung darf nicht bei ungünstigen meteorologischen Bedingungen, z.B. während einer Inversionswetterlage (austauscharmen Wetterlage) erfolgen. Bei Bedarf sind hierzu zusätzliche geeignete technische Maßnahmen oder spezielle Anweisungen für die kontrollierte Belüftung der begasten Räume/Objekte nach der Begasung in Erwägung zu ziehen (wie der Einsatz geeigneter Filtersysteme oder Absaugvorrichtungen). Die emissionsbegrenzenden Maßnahmen müssen dem Stand der Technik entsprechen. Die maximale Belüftung nach der Begasung ist durch nationale Regelungen geregelt. Entsprechend diesen Bestimmungen darf der Eintrag von Phosphin in die Luft im Gefahrenbereich während der Belüftung nach der Begasung eine Massenkonzentration von $0,5 \text{ mg PH}_3/\text{m}^3$ bzw. einen Abgasmassenstrom von $2,5 \text{ g PH}_3/\text{h}$ nicht überschreiten. Bei der Belüftung PH_3 -begaster Lagerräume, Silos und Containern dürfen diese Konzentrationen im Abgas nicht überschritten werden.

19. Der Begasungsleiter darf Räume, Einrichtungsgegenstände und begaste Güter erst freigeben, wenn durch geeignete Nachweisverfahren sichergestellt ist, dass keine Gefährdung mehr durch Begasungsmittel besteht.

20. Die Luftkonzentration in Räumen und in der Nähe von behandelten Gütern und Einrichtungen muss unter $0,01$ ppm Phosphin liegen. Die Messungen müssen mit Geräten durchgeführt werden, die eine genaue Einhaltung des Referenzwertes ermöglichen. Die Messungen sind in Bodennähe und in Bereichen durchzuführen, in denen die höchsten Konzentrationen des Begasungsmittels zu erwarten sind.

21. In Fällen, in denen die begasten Waren in eine gasdichte Verpackung (z. B. Kunststofffolie) umgepackt werden, muss auch die Freisetzung von Phosphingas an den Endverbraucher nach dem Öffnen berücksichtigt werden.

22. Es ist sicherzustellen, dass das Biozidprodukt nach der Anwendung aus der Umgebung von Lebens- und Futtermitteln sowie sonstigen Begasungsgütern entfernt wird.

23. Alle Verpackungen müssen vor dem Umgang mit Begasungsgütern entfernt werden. Reste müssen gemäß den Vorschriften der Entsorgung für Gefahrabfälle entsorgt werden.

24. Nach der Begasung und der Belüftung zwecks Anwendersicherheit, sind die folgenden Wartezeiten vor dem Verkauf oder Verzehr der begasten Lebensmittel/Futtermittel einzuhalten. Während der gesamten Wartezeit muss eine Belüftung stattfinden.

- 7 Tage für Backmischungen; verarbeitetes Gemüse (Kartoffelprodukte); gepökelte/geräucherte, getrocknete und verarbeitete Fleisch- und Fischprodukte; Milcherzeugnisse (wie Milchpulver, Käse und Nebenerzeugnisse etc.); verarbeiteter Kaffee; verarbeitete Aromate; Schokolade und Schokoladenprodukte; verarbeitete Süßigkeiten und Zucker; verarbeitete Nüsse.

- Keine (0 Tage) für Getreideverarbeitungszeugnisse (inklusive gewalzter Fraktionen und abgepackte Getreideerzeugnisse); verarbeitete Getreidelebensmittel (wie Nudelprodukte, Snacks, Kekse etc.).

25. Das folgende Resistenzmanagement muss bei der Anwendung des Produkts, dem Anwendungszeitpunkt und beim Monitoring der Populationen in Schlüsselgebieten zur Feststellung wesentlicher Veränderungen in der Empfindlichkeit befolgt werden:

- Anwendung des Produkts: Das Produkt nur in den angegebenen Mengen verwenden. Die vom Hersteller vorgegebenen Anwendungsmengen und -techniken nicht erhöhen oder verringern, da dies die Entwicklung von

Resistenzen beschleunigen kann. Die anschließende Stärke des Schädlingsbefalls muss überwacht werden um die Bekämpfung und den Erfolg der Anwendung beurteilen zu können.

- Anwendungszeitpunkt: Es ist darauf zu achten, dass die Angaben des Herstellers und des örtlichen Beraters befolgt werden.
- Vor der Anwendung: Die Verwendung eines Resistenzschnelltests und eines Drucktests wird nachdrücklich empfohlen, insbesondere falls der hinreichende Verdacht besteht, dass Undichtigkeiten des zu begasenden Objektes bestehen oder gering PH3-sensitive Insektenstämme vorliegen.
- Basiswert bestimmen und die Populationen in Schlüsselgebieten überwachen, um wesentliche Veränderungen in der Empfindlichkeit festzustellen.

26. Folgende Vorsichtsmaßnahmen sollten getroffen werden, um die Gefahr der Resistenzbildung gegenüber dem Begasungsmittel bei Insekten zu reduzieren:

- Gutes Hygieneverhalten, ordnungsgemäße Lagerbedingungen, insektenresistente Verpackungen und alle übrigen Maßnahmen um den Befall durch unterschiedliche Entwicklungsstufen zu verhindern und die Notwendigkeit von Begasungen zu reduzieren.
- Wenn Begasungsmittel regelmäßig eingesetzt werden, sollten Sicherheitsmaßnahmen etabliert werden, um Misserfolgen bei der Bekämpfung entgegen zu wirken. Die vollständige Bekämpfung aller Insekten (Entseuchung aller Entwicklungsstufen) durch eine Behandlung ist die beste Absicherung gegen Resistenzen.
- In Bereichen, die regelmäßig begast werden, sollten regelmäßige Kontrollen auf Resistenzen durchgeführt werden. Falls Anzeichen für Resistenzen auftreten (wie durch mangelnden Bekämpfungserfolg oder auf Basis eines Testverfahrens erkennbar) sollten alle Anstrengungen unternommen werden um die Population zu tilgen. Abhängig von der Situation können die zur Tilgung notwendigen Maßnahmen variieren; diese können eine Anzahl an Verfahren unter Verwendung von chemischen und nicht-chemischen Mitteln beinhalten.
- Der Wechsel des Begasungsmittels kann in einigen Fällen wirksam sein, insbesondere falls Kreuzresistenzen kein Problem darstellen.

Fußnoten:

¹ Atemschutzgeräte – Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden; Deutsche Fassung EN 529

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Das Einatmen dieses giftigen Gases ist so weit wie möglich zu vermeiden.

NACH EINATMEN:

An die frische Luft bringen und in einer Position für ungehinderte Atmung lagern. Sofort Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren. Hinweis für medizinisches Personal: Sofort lebenserhaltende Maßnahmen einleiten, danach GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

NACH VERSCHLUCKEN:

KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren. Hinweis für medizinisches Personal: Sofort lebenserhaltende Maßnahmen einleiten, danach GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

NACH HAUTKONTAKT:

Beschmutzte Kleidungsstücke ausziehen. Sämtliche Reste des Produkts von der Haut entfernen. Sofort mit reichlich Wasser spülen. Nach dem Waschen der Haut: Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren. Hinweis für medizinisches Personal: Sofort lebenserhaltende Maßnahmen einleiten, danach GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

NACH AUGENKONTAKT:

Sämtliche Reste des Produkts entfernen. Mit Wasser spülen, ggf. Kontaktlinsen entfernen. 5 Minuten mit Wasser weiter spülen. Rettungsdienst (Tel. 112) oder Arzt anrufen.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Bedingungen für eine kontrollierte Entsorgung einschließlich der Eluierbarkeit bei Deponielagerung:

Unter normalen Umständen fallen bei der bestimmungsgemäßen Verwendung praktisch keine zu entsorgenden Rückstände an. Leere Produktverpackungen sollten nach einem von der örtlichen Abfallentsorgungsbehörde genehmigten Verfahren entsorgt werden.

Phosphorwasserstoff entwickelnde Stoffe, Produkte und deren Rückstände gilt der Abfallschlüssel Nr. 061301 (gemäß Richtlinie 2001/118/EG). Es wird empfohlen, nur entgastes Material unter Beachtung der geltenden Vorschriften zu entsorgen (Abfallschlüssel Nr. 060316 gemäß Richtlinie 2001/118/EG).

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Die Haltbarkeit beträgt 36 Monate.

Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

Gefährlich für Wildtiere.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund technischer Einschränkungen die folgenden Sicherheitshinweise in Kapitel 3 des XML SPC nicht korrekt dargestellt werden können:

1) "P302 + P335+ P352 + P310: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Lose Partikel von der Haut abbürsten. Mit viel Wasser waschen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen"

Daher musste dieser Sicherheitshinweis in 4 separate Hinweise aufgeteilt werden (P302, P335, P352 und P310).

2) "P301 + P330 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen."

Daher musste dieser Sicherheitshinweis in 2 separate Hinweise aufgeteilt werden (P301+P310 und P330).

3) "P305 + P351 + P338 + P310: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen."

Daher musste dieser Sicherheitshinweis in 2 separate Hinweise aufgeteilt werden (P305+P351+P338 und P310).