FR

ANNEXE

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

BRODITEC CX-27F

Type(s) de produit

TP14: Rodenticides

Numéro d'autorisation: BE2025-0008

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: BE-0034869-0000

Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	BRODITEC CX-27F Broditop Strike CF Broditop Matrix CF Broditop LC CF Zed Strike CF Zed Matrix CF Zed LC CF Rodibrod Strike CF Rodibrod Matrix CF Rodibrod LC CF Protemax Strike CF Protemax Matrix CF Protemax LC CF Deviltop Strike CF Deviltop Matrix CF Deviltop LC CF ZAPI-TOP Strike CF ZAPI-TOP Matrix CF ZAPI-TOP LC CF ZAPI-RAT Strike CF ZAPI-RAT Matrix CF ZAPI-RAT LC CF BRODILUX CEREALS FATAL CEREALS PRO Muskil C3REAL Deviltop C3REAL Broditop C3REAL Rodibrod CR
---------------------------------	---

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	ZAPI S.p.A.
	Adresse	via Terza Strada 12 35026 Conselve Italie
Numéro de l'autorisation		BE2025-0008
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		BE-0034869-0000
Date de l'autorisation		17/02/2023
Date d'expiration de l'autorisation		16/02/2028

1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	Zapi S.p.A.
Adresse du fabricant	Via Terza Strada 12 35026 Conselve Italie
Emplacement des sites de fabrication	Zapi S.p.A. site 1 Via Terza Strada 12 35026 Conselve Italie

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	Brodifacoum
------------------	-------------

Nom du fabricant	P.M. Tezza S.r.l. (Art. 95 list: ACTIVA S.r.l.)
Adresse du fabricant	Via del Lavoro 326 37050 Angiari (VR) Italie
Emplacement des sites de fabrication	P.M. Tezza S.r.l. (Art. 95 list: ACTIVA S.r.l.) site 1 Via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio (VR) Italie

Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-napthyl]-4-hydroxycoumarin	Substance active	56073-10-0	259-980-5	0,0027 % (p/p)

2.2. Type(s) de formulation

RB - Appât prêt à l'emploi : grain

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée {1:indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger: }.
Conseils de prudence	<p>P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.</p> <p>P102: Tenir hors de portée des enfants.</p> <p>P103: Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.</p> <p>P260: Ne pas respirer les poussières.</p> <p>P314: Consulter un médecin en cas de malaise.</p> <p>P501: Éliminer le contenu dans conformément aux réglementations nationales/régionales applicables.</p> <p>P501: Éliminer le récipient dans conformément aux réglementations nationales/régionales applicables.</p>

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1. Description de l'utilisation

Tableau 1.
Campagnols des champs – grand public – intérieur

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Microtus arvalis</i> Nom commun: Campagnol des champs Stade de développement: juvéniles et adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 45 - 50 g Nombre et fréquence des applications: Appâts : 45-50 g d'appât par point d'appât espacé de 2-5m.
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	Quantité maximale d'appâts par unité vendue : - 150g (produit contre les souris domestiques, campagnols des champs et rats) Sachets en papier filtre ou en plastique PEBD (15g, 25g ou 50g) conditionnés en : - Blister (PVC ou PVC + carton) avec ou sans sachet intérieur en plastique (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g - Seau ou pot (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 45g jusqu'à 150g - Seau ou pot (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans sachet intérieur (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g - Sachet (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g - Boîte métallique électrolytique non couché avec ou sans sachet intérieur (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g - Boîte (carton) avec ou sans sachet intérieur (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g

<p>- Boîte (carton) contenant à l'intérieur une ou plusieurs boîtes d'appâtage pré-remplies* (PP ou PET ou PVC ou PEHD) (de 45g jusqu'à 150g) avec ou sans sachet intérieur (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD /OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g</p> <p>- Sachet (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) contenant à l'intérieur une ou plusieurs boîtes d'appâtage pré-remplies* (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans sachet intérieur (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g</p>

* les boîtes d'appâtage peuvent être enveloppées dans un film protecteur en polyoléfine.

PEHD (polyéthylène haute densité)

PEBD (polyéthylène basse densité)

4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Les postes d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres des rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.2. Description de l'utilisation

Tableau 2.

Rats – grand public – intérieur

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: Rat brun Stade de développement: juvéniles et adultes Nom scientifique: <i>Rattus rattus</i> Nom commun: Rat noir Stade de développement: juvéniles et adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 90 - 100 g Nombre et fréquence des applications: Appâts : 90-100 g d'appât par point d'appât espacé de 5-10m.
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	Quantité maximale d'appâts par unité vendue : - 150g (produit contre les souris domestiques, campagnols des champs et rats) Sachets en papier filtre ou en plastique PEBD (15g, 25g ou 50g) conditionnés en : - Blister (PVC ou PVC + carton) avec ou sans sachet intérieur en plastique (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g - Seau ou pot (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 45g jusqu'à 150g - Seau ou pot (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans sachet intérieur (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g - Sachet (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g - Boîte métallique électrolytique non couché avec ou sans sachet intérieur (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g - Boîte (carton) avec ou sans sachet intérieur (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g - Boîte (carton) contenant à l'intérieur une ou plusieurs boîtes d'appâtage pré-remplies* (PP ou PET ou PVC ou PEHD) (de 45g jusqu'à 150g) avec ou sans sachet intérieur (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD /OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g

- Sachet (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) contenant à l'intérieur une ou plusieurs boîtes d'appâtage pré-remplies* (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans sachet intérieur (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g

* les boîtes d'appâtage peuvent être enveloppées dans un film protecteur en polyoléfine.

PEHD (polyéthylène haute densité)

PEBD (polyéthylène basse densité)

4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Les postes d'appâtage doivent être inspectés seulement 5 à 7 jours après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.3. Description de l'utilisation

Tableau 3.

Campagnols des champs et rats – grand public – extérieur autour des bâtiments

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: <i>Microtus arvalis</i> Nom commun: Campagnol des champs Stade de développement: juvéniles et adultes</p> <p>Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: Rat brun Stade de développement: juvéniles et adultes</p> <p>Nom scientifique: <i>Rattus rattus</i> Nom commun: Rat noir Stade de développement: juvéniles et adultes</p>
Domaine(s) d'utilisation	<p>utilisation en extérieur</p> <p>Extérieur autour des bâtiments</p>
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Application des appâts</p> <p>Description détaillée: Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés</p>
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	<p>Taux d'application: 90 - 100 g Rats</p> <p>Taux d'application: 45 - 50 g Campagnols</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Appâts : Campagnols : 45-50 g d'appât par point d'appât espacé de 2-5m. Rats : 90-100 g d'appât par point d'appât espacé de 5-10m.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Quantité maximale d'appâts par unité vendue : - 150g (produit contre les souris domestiques, campagnols des champs et rats)</p> <p>Sachets en papier filtre ou en plastique PEBD (15g, 25g ou 50g) conditionnés en :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blister (PVC ou PVC + carton) avec ou sans sachet intérieur en plastique (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g - Seau ou pot (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 45g jusqu'à 150g - Seau ou pot (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans sachet intérieur (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g - Sachet (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g - Boîte métallique électrolytique non couché avec ou sans sachet intérieur (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g - Boîte (carton) avec ou sans sachet intérieur (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g - Boîte (carton) contenant à l'intérieur une ou plusieurs boîtes d'appâtage pré-remplies* (PP ou PET ou PVC ou PEHD) (de 45g

jusqu'à 150g) avec ou sans sachet intérieur (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD /OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g - Sachet (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) contenant à l'intérieur une ou plusieurs boîtes d'appâtage pré-remplies* (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans sachet intérieur (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET) - de 45g jusqu'à 150g

* les boîtes d'appâtage peuvent être enveloppées dans un film protecteur en polyoléfine.

PEHD (polyéthylène haute densité)

PEBD (polyéthylène basse densité)

4.3.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés
- Les postes d'appâtage doivent être inspectés [pour les campagnols - au minimum tous les 2 à 3 jours au] [pour les rats - seulement 5 à 7 jours après] le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

4.3.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Ne pas utiliser le produit à proximité d'eaux de surface (e.g. rivières, étangs, cours d'eau, digues, canaux d'irrigation).

4.3.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.3.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.3.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.4. Description de l'utilisation

Tableau 4.

Campagnols des champs et rats – professionnels – intérieur

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: <i>Microtus arvalis</i> Nom commun: Campagnol des champs Stade de développement: juvéniles et adultes</p> <p>Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: Rat brun Stade de développement: juvéniles et adultes</p> <p>Nom scientifique: <i>Rattus rattus</i> Nom commun: Rat noir Stade de développement: juvéniles et adultes</p>
Domaine(s) d'utilisation	<p>utilisation en intérieur</p> <p>Intérieur</p>
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Application des appâts</p> <p>Description détaillée: Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés</p>
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	<p>Taux d'application: 90 - 100 g Rats</p> <p>Taux d'application: 45 - 50 g Campagnols</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Appâts : Campagnols : 45-50 g d'appât par point d'appât espacé de 2-5m. Rats : 90-100 g d'appât par point d'appât espacé de 5-10m.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Conditionnement minimum de 3 kg.</p> <p>Sachets en papier filtre ou en plastique PEBD (15g, 25g ou 50g) conditionnés en :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Carton ou boîte (carton) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Carton ou boîte (carton) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Carton ou boîte (carton) contenant à l'intérieur une ou plusieurs boîtes d'appâtage pré-remplies* (PP ou PET ou PVC ou PEHD) - de 3 kg jusqu'à 25kg

- Sac (PEBD ou PEBD/papier) - de 3 kg jusqu'à 25 kg

Appâts en vrac conditionnés en :

- Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 10 kg

- Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg

- Carton ou boîte (carton) avec revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 10 kg

- Carton ou boîte (carton) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg

- Sac (PEBD ou PEBD/papier) - de 3 kg jusqu'à 10 kg

Pour les appâts en grain en vrac, le conditionnement maximum est limité à 10 kg.

* les boîtes d'appâtage peuvent être conditionnées dans un film de protection en polyoléfine.

PEHD (polyéthylène haute densité)

PEBD (polyéthylène basse densité)

4.4.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Les postes d'appâtage doivent être inspectées [pour les campagnols - au minimum tous les 2 à 3 jours au] [pour les rats - seulement 5 à 7 jours après] le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

- Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

4.4.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

4.4.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

4.4.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.4.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.5. Description de l'utilisation

Tableau 5.
Souris domestiques, campagnols des champs et rats – professionnels – extérieur autour des bâtiments

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Mus musculus</i> Nom commun: souris domestique Stade de développement: juvéniles et adultes Nom scientifique: <i>Microtus arvalis</i> Nom commun: Campagnol des champs Stade de développement: juvéniles et adultes Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: Rat brun Stade de développement: juvéniles et adultes Nom scientifique: <i>Rattus rattus</i> Nom commun: Rat noir Stade de développement: juvéniles et adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en extérieur Extérieur autour des bâtiments
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 90 - 100 g Rats Taux d'application: 45 - 50 g Souris/Campagnols Nombre et fréquence des applications: Appâts : Souris/Campagnols : 45-50 g d'appât par point d'appât espacé de 2-5m. Rats : 90-100 g d'appât par point d'appât espacé de 5-10m.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Conditionnement minimum de 3 kg.

Sachets en papier filtre ou en plastique PEBD (15g, 25g ou 50g) conditionnés en :

- Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 25 kg
- Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg
- Carton ou boîte (carton) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 25 kg
- Carton ou boîte (carton) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg
- Carton ou boîte (carton) contenant à l'intérieur une ou plusieurs boîtes d'appâtage pré-remplies* (PP ou PET ou PVC ou PEHD) - de 3 kg jusqu'à 25kg
- Sac (PEBD ou PEBD/papier) - de 3 kg jusqu'à 25 kg

Appâts en vrac conditionnés en :

- Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 10 kg
- Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg
- Carton ou boîte (carton) avec revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 10 kg
- Carton ou boîte (carton) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg
- Sac (PEBD ou PEBD/papier) - de 3 kg jusqu'à 10 kg

Pour les appâts en grain en vrac, le conditionnement maximum est limité à 10 kg.

* les boîtes d'appâtage peuvent être conditionnées dans un film de protection en polyoléfine.

PEHD (polyéthylène haute densité)

PEBD (polyéthylène basse densité)

4.5.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques (par exemple, de la pluie, de la neige, etc.). Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Les postes d'appâtage doivent être inspectés [pour les souris et les campagnols - au minimum tous les 2 à 3 jours au] [pour les rats - seulement 5 à 7 jours après] le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.
- Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

4.5.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Ne pas placer directement ce produit dans les terriers.

- Ne pas utiliser le produit à proximité d'eaux de surface (e.g. rivières, étangs, cours d'eau, digues, canaux d'irrigation).

4.5.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

4.5.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.5.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.6. Description de l'utilisation

Tableau 6.

Souris domestiques, campagnols des champs et rats – Utilisateurs professionnels ayant des compétences avancées démontrées – intérieur

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Mus musculus</i> Nom commun: souris domestique Stade de développement: juvéniles et adultes Nom scientifique: <i>Microtus arvalis</i> Nom commun: Campagnol des champs Stade de développement: juvéniles et adultes Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: Rat brun Stade de développement: juvéniles et adultes

	<p>Nom scientifique: <i>Rattus rattus</i> Nom commun: Rat noir Stade de développement: juvéniles et adultes</p>
Domaine(s) d'utilisation	<p>utilisation en intérieur</p> <p>Intérieur</p>
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Application des appâts</p> <p>Description détaillée: Formulations d'appâts : - Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés ; - Points d'appâts couverts et protégés.</p>
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	<p>Taux d'application: 90 - 100 g Rats</p> <p>Taux d'application: 45 - 50 g Souris/Campagnols</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Appâts : Souris/Campagnols : 45-50 g d'appât par point d'appât Rats : 90-100 g d'appât par point d'appât</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Conditionnement minimum de 3 kg.</p> <p>Sachets en papier filtre ou en plastique PEBD (15g, 25g ou 50g) conditionnés en :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Carton ou boîte (carton) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Carton ou boîte (carton) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Carton ou boîte (carton) contenant à l'intérieur une ou plusieurs boîtes d'appâtage pré-remplies* (PP ou PET ou PVC ou PEHD) - de 3 kg jusqu'à 25kg - Sac (PEBD ou PEBD/papier) - de 3 kg jusqu'à 25 kg <p>Appâts en vrac conditionnés en :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 10 kg - Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Carton ou boîte (carton) avec revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 10 kg - Carton ou boîte (carton) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Sac (PEBD ou PEBD/papier) - de 3 kg jusqu'à 10 kg

	Pour les appâts en grain en vrac, le conditionnement maximum est limité à 10 kg.
--	--

	* les boîtes d'appâtage peuvent être conditionnées dans un film de protection en polyoléfine.
--	---

	<i>PEHD (polyéthylène haute densité)</i>
--	--

	<i>PEBD (polyéthylène basse densité)</i>
--	--

4.6.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.
- Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

4.6.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.
- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable.
- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.
- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.

4.6.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

4.6.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.6.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.7. Description de l'utilisation

Tableau 7.

Souris domestiques, campagnols des champs et rats – Utilisateurs professionnels ayant des compétences avancées démontrées – extérieur autour des bâtiments

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: <i>Mus musculus</i> Nom commun: souris domestique Stade de développement: juvéniles et adultes</p> <p>Nom scientifique: <i>Microtus arvalis</i> Nom commun: Campagnol des champs Stade de développement: juvéniles et adultes</p> <p>Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: Rat brun Stade de développement: juvéniles et adultes</p> <p>Nom scientifique: <i>Rattus rattus</i> Nom commun: Rat noir Stade de développement: juvéniles et adultes</p>
Domaine(s) d'utilisation	<p>utilisation en extérieur</p> <p>Extérieur autour des bâtiments</p>
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Application des appâts</p> <p>Description détaillée: Formulations d'appâts : - Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés ; - Points d'appâts couverts et protégés ; - Application directe de l'appât prêt à l'emploi dans les terriers.</p>
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	<p>Taux d'application: 90 - 100 g Rats</p> <p>Taux d'application: 45 - 50 g Souris/Campagnols</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Appâts : Souris/Campagnols : 45-50 g d'appât par point d'appât Rats : 90-100 g d'appât par point d'appât</p>

Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Conditionnement minimum de 3 kg.</p> <p>Sachets en papier filtre ou en plastique PEBD (15g, 25g ou 50g) conditionnés en :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Carton ou boîte (carton) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Carton ou boîte (carton) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Carton ou boîte (carton) contenant à l'intérieur une ou plusieurs boîtes d'appâtage pré-remplies* (PP ou PET ou PVC ou PEHD) - de 3 kg jusqu'à 25kg - Sac (PEBD ou PEBD/papier) - de 3 kg jusqu'à 25 kg <p>Appâts en vrac conditionnés en :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 10 kg - Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Carton ou boîte (carton) avec revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 10 kg - Carton ou boîte (carton) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Sac (PEBD ou PEBD/papier) - de 3 kg jusqu'à 10 kg <p>Pour les appâts en grain en vrac, le conditionnement maximum est limité à 10 kg.</p> <p>* les boîtes d'appâtage peuvent être conditionnées dans un film de protection en polyoléfine.</p> <p><i>PEHD (polyéthylène haute densité)</i> <i>PEBD (polyéthylène basse densité)</i></p>

4.7.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.

- Remplacer tout appât dans les points d'appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement (sauf en cas d'application directement dans un terrier).

- Les points d'appât doivent être couverts et placés dans des endroits stratégiques afin de minimiser l'exposition des organismes non cibles.

-
- Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

Application directe dans les terriers :

- Les appâts doivent être placés de manière à minimiser l'exposition des espèces non cibles et des enfants.
- Couvrir ou bloquer les entrées du terrier où est placé l'appât afin de réduire le risque que l'appât soit ressorti ou dispersé.

4.7.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.
- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable.
- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.
- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.
- Ne pas utiliser le produit à proximité d'eaux de surface (e.g. rivières, étangs, cours d'eau, digues, canaux d'irrigation).

4.7.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

4.7.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.7.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.8. Description de l'utilisation

Tableau 8.
Souris domestiques, campagnols des champs et rats –Utilisateurs professionnels ayant des compétences avancées démontrées – Zones ouvertes extérieures

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: <i>Mus musculus</i> Nom commun: souris domestique Stade de développement: juvéniles et adultes</p> <p>Nom scientifique: <i>Microtus arvalis</i> Nom commun: Campagnol des champs Stade de développement: juvéniles et adultes</p> <p>Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: Rat brun Stade de développement: juvéniles et adultes</p> <p>Nom scientifique: <i>Rattus rattus</i> Nom commun: Rat noir Stade de développement: juvéniles et adultes</p>
Domaine(s) d'utilisation	<p>utilisation en extérieur</p> <p>Zones ouvertes extérieures</p>
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Application des appâts</p> <p>Description détaillée: - Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés ; - Points d'appâts couverts et protégés ; - Application directe de l'appât prêt à l'emploi dans les terriers.</p>
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	<p>Taux d'application: 90 - 100 g Rats</p> <p>Taux d'application: 45 - 50 g Souris/Campagnols</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Appâts : Souris/Campagnols : 45-50 g d'appât par point d'appât Rats : 90-100 g d'appât par point d'appât</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Conditionnement minimum de 3 kg.</p> <p>Sachets en papier filtre ou en plastique PEBD (15g, 25g ou 50g) conditionnés en :</p>

- Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 25 kg
- Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg
- Carton ou boîte (carton) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 25 kg
- Carton ou boîte (carton) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg
- Carton ou boîte (carton) contenant à l'intérieur une ou plusieurs boîtes d'appâtage pré-remplies* (PP ou PET ou PVC ou PEHD) - de 3 kg jusqu'à 25kg
- Sac (PEBD ou PEBD/papier) - de 3 kg jusqu'à 25 kg

Appâts en vrac conditionnés en :

- Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 10 kg
- Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg
- Carton ou boîte (carton) avec revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 10 kg
- Carton ou boîte (carton) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg
- Sac (PEBD ou PEBD/papier) - de 3 kg jusqu'à 10 kg

Pour les appâts en grain en vrac, le conditionnement maximum est limité à 10 kg.

* les boîtes d'appâtage peuvent être conditionnées dans un film de protection en polyoléfine.

PEHD (polyéthylène haute densité)

PEBD (polyéthylène basse densité)

4.8.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Remplacer tout appât dans les points d'appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement (sauf en cas d'application directement dans un terrier).
- Les points d'appât doivent être couverts et placés dans des endroits stratégiques afin de minimiser l'exposition des organismes non cibles
- Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

Application directe dans les terriers :

- Les appâts doivent être placés de manière à minimiser l'exposition des espèces non cibles et des enfants.

- Couvrir ou bloquer les entrées du terrier où est placé l'appât afin de réduire le risque que l'appât soit ressorti ou dispersé.

4.8.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.

- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable.

- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.

- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé

- Ne pas utiliser le produit à proximité d'eaux de surface (e.g. rivières, étangs, cours d'eau, digues, canaux d'irrigation).

4.8.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

4.8.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.8.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.9. Description de l'utilisation

Tableau 9.

Rats bruns – Utilisateurs professionnels ayant des compétences avancées démontrées – Décharges extérieures

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: Rat brun Stade de développement: juvéniles et adultes
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en extérieur Décharges extérieures
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: - Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés ; - Points d'appâts couverts et protégés ; - Application directe de l'appât prêt à l'emploi dans les terriers.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 90 - 100 g Nombre et fréquence des applications: Appâts : 90-100 g d'appât par point d'appât
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Conditionnement minimum de 3 kg. Sachets en papier filtre ou en plastique PEBD (15g, 25g ou 50g) conditionnés en : - Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Carton ou boîte (carton) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Carton ou boîte (carton) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Carton ou boîte (carton) contenant à l'intérieur une ou plusieurs boîtes d'appâtage pré-remplies* (PP ou PET ou PVC ou PEHD) - de 3 kg jusqu'à 25kg - Sac (PEBD ou PEBD/papier) - de 3 kg jusqu'à 25 kg Appâts en vrac conditionnés en : - Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec ou sans revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 10 kg - Seau (PP ou PET ou PVC ou PEHD) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Carton ou boîte (carton) avec revêtement intérieur (PEBD) - de 3 kg jusqu'à 10 kg

<p>- Carton ou boîte (carton) avec sachet(s) intérieur(s) (PEBD ou PEBD/OPA ou PEBD/PET ou PEBD/OPA/PET), chaque sachet contenant jusqu'à 1 kg de produit - de 3 kg jusqu'à 25 kg - Sac (PEBD ou PEBD/papier) - de 3 kg jusqu'à 10 kg</p>

Pour les appâts en grain en vrac, le conditionnement maximum est limité à 10 kg.

* les boîtes d'appâtage peuvent être conditionnées dans un film de protection en polyoléfine.

PEHD (polyéthylène haute densité)

PEBD (polyéthylène basse densité)

4.9.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.

- Remplacer tout appât dans les points d'appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement (sauf en cas d'application directement dans un terrier).

- Observer toutes les instructions complémentaires fournies par le code de bonnes pratiques concerné.

- Les points d'appât doivent être couverts et placés dans des endroits stratégiques afin de minimiser l'exposition des organismes non cibles.

Application directe dans les terriers :

- Les appâts doivent être placés de manière à minimiser l'exposition des espèces non cibles et des enfants.

- Couvrir ou bloquer les entrées du terrier où est placé l'appât afin de réduire le risque que l'appât soit ressorti ou dispersé.

4.9.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.

- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, conformément aux recommandations formulées par le code de bonnes pratiques applicable.

- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.

- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.

- Ne pas utiliser le produit à proximité d'eaux de surface (e.g. rivières, étangs, cours d'eau, digues, canaux d'irrigation).

4.9.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

4.9.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.9.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION¹

5.1. Consignes d'utilisation

POUR UTILISATEURS PROFESSIONNELS ET UTILISATEURS PROFESSIONNELS AYANT DES COMPETENCES AVANCEES DEMONTREES

- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.
- Avant de placer un appât, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation.
- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.
- Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle.
- Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.
- Les postes d'appâtage doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils contiennent des rodenticides et qu'ils ne doivent être ni déplacés ni ouverts (se reporter à la section 5.3 pour connaître les informations devant figurer sur l'étiquette).
- Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts.
- L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être traîné à l'extérieur du poste d'appâtage.
- Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles.
- Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers.
- Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation et de nettoyage du produit (le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).
- Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.
- Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des points d'appât à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât.
- Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable. Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants : dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de contrôle alternative.

¹Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

-
- Instructions d'utilisation « spécifique selon l'appât » :
 - Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.
 - Grains, granulés-pastilles en vrac : placer l'appât dans la station d'appât à l'aide d'un dispositif de dosage.

POUR LES UTILISATEURS PROFESSIONNELS AYANT DES COMPETENCES AVANCEES DEMONTREES UNIQUEMENT

- L'utilisateur détermine lui-même la fréquence des inspections de la zone traitée, à la lumière des résultats de l'étude réalisée au début du traitement. Cette fréquence doit être compatible avec les recommandations contenues dans le code de bonnes pratiques applicable.
- Le produit doit être placé à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.).

POUR LES PROFESSIONNELS UNIQUEMENT

- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.
- Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.).

POUR LES UTILISATEURS NON PROFESSIONNELS

- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.
- Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple).
- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.
- Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.).
- Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.
- [Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât - le cas échéant pour la formulation de l'appât dans le produit].
- Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles.
- Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers.
- Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où elles peuvent entrer en contact avec l'eau.

- Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.

- Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.

5.2. Mesures de gestion des risques

POUR LES UTILISATEURS PROFESSIONNELS ET UTILISATEURS PROFESSIONNELS AYANT DES COMPETENCES AVANCEES DEMONTREES

- Éliminer les cadavres des rongeurs conformément à la réglementation locale [Les rongeurs morts doivent être éliminés et détruits par une entreprise spécialisée ou agréée].

POUR LES UTILISATEURS PROFESSIONNELS AYANT DES COMPETENCES AVANCEES DEMONTREES UNIQUEMENT

- Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la brochure) doivent indiquer clairement que le produit ne doit être délivré qu'à des utilisateurs professionnels formés, disposant d'une certification attestant qu'ils respectent les exigences applicables en matière de formation (par exemple « à l'usage des utilisateurs professionnels ayant des compétences avancées démontrées uniquement »).

- Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut suspecter une résistance à la substance active.

- Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.

- Ne pas alterner l'utilisation de différents anticoagulants d'efficacité comparable ou inférieure aux fins de la gestion de la résistance. Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant.

- Ne pas laver à l'eau les postes d'appâtage ou les ustensiles utilisés dans les points d'appâts couverts et protégés, entre les applications.

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels de la campagne de dératisation.

POUR LES PROFESSIONNELS UNIQUEMENT

- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement (par exemple, au moins deux fois par semaine).

- Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en guise d'appâts permanents pour prévenir toute infestation de rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs.

- Les informations sur le produit (c'est-à-dire l'étiquette et/ou la notice) doivent clairement indiquer les éléments suivants :

- le produit ne doit pas être fourni au grand public (par exemple, « à usage professionnel uniquement »).
- le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés (par exemple, « à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés uniquement »).

• les utilisateurs doivent convenablement étiqueter les postes d'appâtage avec les informations visées à la section 5.3 du RCP (par exemple, « étiqueter les postes d'appâtage conformément aux recommandations relatives au produit »).

- L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent recommander de façon claire qu'en cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles.

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.

- Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans procéder à une évaluation préalable du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.

- Ne pas laver à l'eau les postes d'appâtage entre les applications.

- Éliminer les cadavres des rongeurs conformément à la réglementation locale [Les rongeurs morts doivent être éliminés et détruits par une entreprise spécialisée ou agréée].

POUR LES UTILISATEURS NON PROFESSIONNELS

- Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.

- Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en guise d'appâts permanents (par exemple, pour éviter toute infestation de rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs).

- Les informations sur le produit (c'est-à-dire l'étiquette et/ou la notice) doivent clairement indiquer les éléments suivants :

le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés (par exemple, « à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés uniquement »).

les utilisateurs doivent convenablement étiqueter les postes d'appâtage avec les informations visées à la section 5.3 du RCP (par exemple, « étiqueter les postes d'appâtage conformément aux recommandations relatives au produit »).

- L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent recommander de façon claire qu'en cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles.

- Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés.

- Éliminer les cadavres des rongeurs conformément à la réglementation locale [Les rongeurs morts doivent être éliminés et détruits par une entreprise spécialisée ou agréée].

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.

-
- Antidote : Administration de Vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.
 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Rincer la peau à l'eau. Si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Si des symptômes apparaissent, rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
 - EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche.

En cas de symptômes : Appeler le 112/ambulance pour avoir une assistance médicale

En l'absence de symptômes : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin

Informations au personnel de santé / au médecin : Initier les mesures de premiers secours si nécessaire, puis appeler un CENTRE ANTIPOISON.

Contactez un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.

- EN CAS D'INHALATION : Si des symptômes apparaissent, appeler un centre antipoison/un médecin.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes : « ne pas déplacer ni ouvrir » ; « contient un rodenticide » ; « nom du produit ou numéro d'autorisation » ; « substance(s) active(s) » et « en cas d'incident, contacter un centre antipoison [La Belgique : 070 245 245] ».

- Dangereux pour la faune.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Au terme de la période de traitement, éliminer l'appât non consommé et l'emballage conformément à la réglementation locale [L'emballage et les restes (consommés ou non) de rodenticides sont considérés comme des déchets dangereux. L'enlèvement et la destruction doivent être effectués par une entreprise spécialisée ou agréée].

- Ne pas déverser le produit non utilisé sur le sol, dans les cours d'eau, dans les canalisations (évier, toilettes...) ni dans les égouts.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil.
- Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.
- Durée de conservation : 2 ans
- Stocker le produit à une température inférieure à 35 °C
- Stocker le produit à l'abri de la lumière.

- Ne pas stocker à proximité des denrées alimentaires et boissons destinées à la consommation humaine et animale.

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

- En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.
- Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.
- Ce produit contient un agent amérisant et un colorant.